

ਹਾਰਟ ਕੈਥੇਟੇਰੀਜ਼ੇਸ਼ਨ

ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਪਰਕੁਟੇਨੀਆਸ ਕੌਰੋਨਰੀ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ (ਪੀ ਸੀ ਆਈ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ

After a Heart Catheterization

and possible Percutaneous Coronary Intervention (PCI)

ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ (ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ) ਜਾਂ ਇਨਟਰਨਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ (ਇੰਟਰਨਿਸਟ) ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ:

- ਐਸਪਰੀਨ
- ਟਿਕਾਗਰੇਲੋ (ਬਰੀਲਿੰਟਾ)
- ਕਲੋਪੀਡੋਗਰੇਲ (ਪਲੈਵਿਕਸ)

ਘਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ

- ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੀ ਆਮ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫ਼ੀ ਨਾ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
- ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਉ।
- ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਉ।

ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ:

- ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ, 10 ਪੋਂਡ (5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕੋ।
- ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਿਸਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਅਪਰੇਸ਼ਨ) ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਬੀ ਸੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਿਸਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾਲੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਐਕਸੈਂਸ ਸਾਈਟ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਗੁੱਟ ਵਿਚ ਨਾਲੀ - ਅਗਲੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ:

- ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਢਾਤੀ 'ਤੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਖੋ।
- ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੌਜੋ।

ਚੱਡਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਲੀ - ਅਗਲੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ:

- ਜਿੱਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਚੱਡੇ ਵਾਲੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖੋ।
- ਪੌੜੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੜ੍ਹੋ।
- ਨਾ ਝੁਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ:

- ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਰੱਖੋ।
- 24 ਘੰਟੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਲਾਹ ਦਿਉ।

ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ:

- ਸਿਰਦ ਸ਼ਾਵਰ ਹੀ ਲਾਉ - ਟੱਬ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ।
- ਸਵਿਮਿਂਗ ਪੂਲ ਜਾਂ ਹੌਟ ਟੱਬ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਓ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਲੀ ਲੱਗੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੀਲ ਪਿਆ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੱਜ ਪਈ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਨ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੀਕ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਟਣ ਨੂੰ ਕਈ ਹਫਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ: ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ

- ਨਾਲੀ ਲੱਗੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੋਆਰਾਮੀ ਲਈ ਆਮ ਐਸੀਟਾਮੀਨੋਫਿਨ (ਟੈਲਾਨੋਲ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਦਾ ਬਰਾਂਡ) ਲਉ।
- ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।

ਪੈਰਵੀ

- ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਇਕ (1) ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ (ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ) ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨਟਰਨਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ (ਇੰਟਰਨਿਸਟ) ਕੋਲ 4 ਤੋਂ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਹੋਣ

- ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।
 - ਹੈਲਥਲਿੱਕ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। 8-1-1
(ਬੋਲਿਆਂ ਲਈ 7-1-1)
- ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਇਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ।
- ਇਹ 130 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਦੋਭਾਸੀਏ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਉ। ਕਿਸੇ ਦੋਭਾਸੀਏ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
- ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਓ।
ਹੈਲਥਲਿੱਕ ਬੀ ਸੀ www.HealthLinkBC.ca
ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸਟਰੋਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ www.heartandstroke.com

ਕੀ ਨਿਗ੍ਰਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ

9-1-1 ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਮਕਵੀਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੋਜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ:

- ਨਾਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੱਸ ਕੇ ਢੱਬੋ।
- ਫੋਨ 9-1-1 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।
- ਐਮਰਜੰਸੀ ਅਸਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਨਾਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਓ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਐਮਿਨਾਇਨਾ/ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਦਰਦ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ:

- ਨਾਈਟਰੋਗਲਿਸ਼ੀਨ ਦੀ ਇਕ ਸਪਰੇਅ ਲਉ।
- ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 9-1-1 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਐਮਰਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ

ਜੇ ਨਾਲੀ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਲੱਤ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਵਿਚ ਜਾਓ:

- ਠੰਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ
- ਬਹੁਤ ਸੋਜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ
- ਸੁੰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦੀ ਹੈ
- ਰੰਗ ਬਦਲਦੀ ਹੈ (ਉੱਗਲਾਂ ਦੇ ਨਹੁਆਂ ਵਿਚ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਚਮੜੀ ਪੀਲੀ ਜਾਂ ਨੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ)

ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਨਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ:

- 38.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ (101.3 ਡਿਗਰੀ ਫਰਨਹਾਈਟ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ
- ਨਾਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੀਕ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ
- ਨਾਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਸੋਜ
- ਨਾਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਹੱਥ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਗਰਮ ਹੈ