

急救服務 Emergency Services

胸管取出後

After a Chest Tube is Removed

您胸內插有一根胸管，用來排出漏氣口或氣胸的氣體。

您最近做的胸部 X 光透視顯示氣體泄漏已經停止，您的肺部也已恢復正常。儘管如此，您所患的氣胸可能復發。而且，您在未來患上氣胸的可能性也更大了。

怎樣在家自我護理

- 胸管取出後，用干淨、乾燥的綑帶包紮插管傷口處兩到三天。
- 包紮被打濕或變臟時，請更換。
- 繼續練習深呼吸。

為了您的安全

- 請不要在胸管取出後的十四天（兩個星期）內坐飛機。
- 如果今後您想參加以下活動，請先與您的家庭醫生商量：
 - 浮潛。
 - 高海拔攀爬。如果您的肺部再次塌陷，則會非常危險。

您的胸管取出日期： _____

Your chest tube was removed on:

何時求助

如果發生下列情況，請約見您的家庭醫生：

- 您的傷口發紅，流膿（黃色或綠色濃液），或者傷口散發出難聞的氣味。
- 您發燒超過攝氏 38.5°C（華氏 101.3°F）。

就近急診，如果：

- 您呼吸困難。
- 您胸部疼痛。
- 發生出血，血滲出胸部包紮的綑帶。

告訴急診室的護士和醫生您曾患氣胸，而且插過胸管。

更多資訊，可諮詢：

- 您的家庭醫生
- 撥打 HealthLinkBC - 8-1-1（聾啞人士專線 7-1-1）或上網瀏覽 www.HealthLinkBC.ca。