

急救服务 Emergency Services

## 胸管取出后

### After a Chest Tube is Removed

您胸内插有一根胸管，用来排出漏气口或气胸的气体。

您最近做的胸部 X 光透视显示气体泄漏已经停止，您的肺部也已恢复正常。尽管如此，您所患的气胸可能复发。而且，您在未来患上气胸的可能性也更大了。

#### 怎样在家自我护理

- 胸管取出后，用干净、干燥的绷带包扎插管伤口处两到三天。
- 包扎被打湿或变脏时，请更换。
- 继续练习深呼吸。

#### 为了您的安全

- 请不要在胸管取出后的十四天内（两个星期）坐飞机。
  - 如果今后您想参加以下活动，请先与您的家庭医生商量：
    - 浮潜。
    - 高海拔攀爬。
- 如果您的肺部再次塌陷，则会非常危险。

#### 何时求助

如果发生下列情况，请约见您的家庭医生：

- 您的伤口发红，流脓（黄色或绿色浓液），或者，伤口散发出难闻的气味。
- 您发烧超过摄氏 38.5°C（华氏 101.3°F）。

#### 就近急诊，如果：

- 您呼吸困难。
- 您胸部疼痛。
- 发生出血，血渗出胸部包扎的绷带。

告诉急诊室的护士和医生您曾患气胸，而且插过胸管。

#### 更多资讯，可咨询：

- 您的家庭医生
- 拨打 HealthLinkBC - 8-1-1（聋哑人士专线 7-1-1）或上网浏览 [www.HealthLinkBC.ca](http://www.HealthLinkBC.ca)。

您的胸管取出日期： \_\_\_\_\_

Your chest tube was removed on: