

Emergency Services

After a Chest Tube is Removed

خدمات اورژانس

پس از برداشته شدن لوله قفسه سینه

شما در قفسه سینه خود یک لوله قفسه سینه (چست تیوب) برای بیرون راندن هوای نشت شده یا نوموتراکس داشته اید.

عکسبرداری اخیر از قفسه سینه شما نشان میدهد که نشت هوا متوقف شده و ریه شما به حالت طبیعی بازگشته است. با اینحال نوموتراکس ممکن است برگردد. همچنین احتمال بیشتری وجود دارد که شما در آینده دچار نوموتراکس بشوید.

چگونه در خانه از خود مراقبت کنید

- به مدت 2 تا 3 روز پس از برداشتن لوله از پانسمان خشک و تمیز در آن محل استفاده کنید.
- پانسمان را در صورت خیس یا کثیف شدن عوض کنید.
- به تمرینات تنفس عمیق خود ادامه دهید.

به جهت ایمنی خودتان

- تا 14 روز (2 هفته) پس از برداشته شدن لوله با هواپیما سفر نکنید.
- اگر میخواهید در آینده در هر یک از فعالیتهای زیر شرکت کنید با دکتر خانواده خود مشورت کنید:
 - غواصی (اسکوبا дайوینگ).
 - کوهپیمائی در ارتفاعات بالا.
- در صورتی که ریه شما دوباره دچار رویهم افتادگی شود ممکن است بسیار خطرناک باشد.

زمان درخواست کمک

در موارد زیر برای دیدن پزشک خانواده خود قرار بگذارید:

زخم شما قرمز است، ترشح چرکی دارد (ترشح به رنگ زرد یا سبز) و یا بوی بدی از آن استشمام میشود.

تب بالای 38.5 درجه سانتیگراد (101.3 درجه فارنهایت) دارید.

در موارد زیر به نزدیکترین بخش اورژانس مراجعه کنید:

به سختی نفس میکشید.

در قفسه سینه درد دارید.

از داخل پانسمانی که بر روی قفسه سینه دارید خونریزی میکنید.

به پرستار و پزشک در اورژانس بگوئید که در گذشته ریه رویهم افتاده و لوله قفسه سینه داشته اید.

برای آگاهی بیشتر، خوب است سوال کنید:

- از دکتر خانوادگی تان
- با شماره 1-1-8 (برای ناشنویان و کم شنوایان با شماره 7-1-1) تماس حاصل کرده یا به آدرس وبسایت www.HealthLinkBC.ca مراجعه کنید.

لوله قفسه سینه شما در

تاریخ: _____ برداشته شد.

Your chest tube was removed on: