

Dịch Vụ Cấp Cứu Emergency Services

Sau Khi Tháo Ống Luồn Ngực After a Chest Tube is Removed

Quý vị đã được tháo ống luồn ngực để thoát không khí từ một chỗ rò khí hay phổi tràn khí (pneumothorax).

Hình chụp quang tuyến x ngực quý vị mới đây nhất cho thấy chỗ rò khí đã ngưng và phổi quý vị đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, chúng phổi tràn khí có thể tái phát. Ngoài ra, nay quý vị dễ có thể bị phổi tràn khí trong tương lai.

Cách tự chăm sóc ở nhà

- Quán băng sạch, khô ở chỗ này trong 2 đến 3 ngày sau khi tháo ống.
- Thay băng mới khi bị ướt hoặc dơ bẩn.
- Tiếp tục tập hít thở sâu.

Để giữ an toàn cho quý vị

- Đừng đi máy bay trong 14 ngày (2 tuần) sau khi tháo ống luồn ngực.
- Nói chuyện với bác sĩ gia đình của quý vị nếu có bất cứ lúc nào sau này quý vị muốn tham gia các sinh hoạt sau đây:
 - Lặn sâu dưới biển.
 - Leo lên những nơi cao.

Nếu phổi quý vị bị xẹp lại thì có thể rất nguy hiểm.

Ống luồn ngực của quý vị được tháo ra vào:

Your chest tube was removed on:

Khi nào nhờ giúp

Hãy hẹn đến bác sĩ gia đình nếu:

- Vết thương của quý vị tấy đỏ, chảy mủ (có màu vàng hoặc xanh), hoặc có mùi hôi.
- Quý vị bị sốt hơn 38.5°C (101.3°F).

Hãy đến Phòng Cấp Cứu gần nhất nếu:

- Quý vị khó thở.
- Quý vị đau ngực.
- Quý vị chảy máu thấm qua băng trên ngực.

Hãy cho y tá và bác sĩ trong Phòng Cấp Cứu biết trước đây quý vị đã từng bị xẹp phổi và luồn ống thoát khí ở ngực.

Muốn biết thêm, nên hỏi:

- Bác sĩ gia đình của quý vị
- HealthLinkBC - gọi số 8-1-1 (7-1-1 cho người điếc hoặc lãng tai) hoặc đến www.HealthLinkBC.ca.