가능한 반응의 징후를 적으시오.

반응 징후 _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

날짜 _____

시간 (시작과 끝) _____

수혈의 상세 내역

Details of the transfusion

♦ 이 난은 간호사가 기입합니다.♦

♦ Nurse completes this section ♦

수혈의 이유 Reason for transfusion

_____

_____

구성/제품 Component/product

_____

_____

_____

유닛 일련 또는 묶음 번호 Unit serial or lot number

_____

_____

_____

날짜와 시작 시간 Date and time started

_____

끝난 시간 Time finished

_____

www.fraserhealth.ca

이 정보는 당신의 의료 제공자의 조언을
대신하지 않습니다.

Catalogue #267284 (February 2022) Korean
To order, visit patienteduc.fraserhealth.ca

Korean

수혈 후

After your transfusion



주의 해야할 점

★ 떠나기 전에 팜플렛을 주의 깊게 읽으세요.

★ 이해 하기 어려운 사항은 간호사에게 문의하세요.

★ 이 팜플렛을 보관하세요. 중요한 정보가 있습니다.

fraserhealth

수혈 후

당신은 오늘 수혈을 했습니다. 당신이 필요로 하는 일부 혈액을 저희가 제공했습니다.

수혈은 매우 안전합니다. 아주 간혹 어떤 분은 반응을 가질 수 있습니다. 이것은 알레르기 반응이거나 추가된 혈액에 대해 몸이 반응을 하는 것입니다. 심각한 반응은 거의 희귀합니다.

수혈을 하는 동안 안전과 반응을 살피기 위해 간호사가 당신을 지켜봅니다.

가끔 병원에서 나간 후 곧 반응이 생기기도 하고, 또는 14 일 후에 생기기도 합니다. 이것을 염두에 두시고, 어떤 것을 살펴봐야 하는지 그리고 언제 도움을 요청할지 아시기 바랍니다.

병원을 떠난 후에 반응이 생기면 "언제 도움을 요청하나"에 지시한 사항을 따르시기 바랍니다. 그리고 다음 번 수혈 약속 때 간호사에게 얘기하세요.

가정 주치의는 당신의 가정의 또는 전문간호사(NP)를 의미합니다.

언제 도움을 요청합니까?

앞으로 14 일 간, 만약 다음 반응들이 생기면, 수혈을 담당하는 치료사나 가정의에게 연락하세요:

- 발진, 두드러기 및 가려움증*
- 새롭게 생기는 메스꺼움과 구토
- 새로 생긴 두통
- 밝은 빛이 방해가 됨
- 매우 뜨겁고 열이 나는 느낌
- 오한
- 허리 통증

*주의: 발진, 두드러기 및 가려움증은 보통 처음 24 시간내에 생깁니다.

의사에게 수혈 받은 것을 말하고, 구체적인 사항을 알려주세요. 그들이 저희에게 당신의 반응에 대해 보고할 필요가 있습니다.

언제라도 다음과 같은 반응이 생기면 9-1-1 번으로 연락하거나 가장 가까운 응급실에 가세요.:

- 눈의 통증과 심한 졸음을 동반한 두통
- 얼굴과 혀가 붓는 것
- 숨이 차고 호흡 곤란
- 가슴 통증과 압박감
- 오줌 (소변) 색이 붉거나 갈색이 됨
- 피부와 눈 흰자위가 노랗게 바뀜

수혈의 상세 내역을 알기 위해 **이 팜플렛을 가져가세요.**

가정의에게 연락할 수 없습니까?

매일 오전 10 시부터 오후 10 시까지 프레이저 보건국 가상 치료에 연락하여 간호사와 말씀하세요.

fraserhealth

전화: 1-800-314-0999

온라인 동시간 채팅:

- QR 코드를 스캔하거나, 또는
- fraserhealth.ca/virtualcare 를 방문하세요.

수혈 후에 질문이 있나요?

HealthLinkBC 에 연락해서 주야 언제든지 간호사와 말씀하세요.

British Columbia HealthLinkBC

전화: 8-1-1

604-215-8110