


Arabic

## تصوير الاوعية/ الصورة الوعائية Angiography/ Angiogram



### المواقع

604-851-4866	<b>Abbotsford-Regional Hospital</b> Medical Imaging 2 <sup>nd</sup> Floor, Fraser Wing 32900 Marshall Road, Abbotsford
604-434-4211	<b>Burnaby Hospital</b> Medical Imaging, 3 <sup>rd</sup> Floor 3935 Kincaid Street, Burnaby
604-533-3308 Ext. 63926	<b>Jim Pattison Outpatient Care and Surgery Centre</b> Medical Imaging, 2 <sup>nd</sup> Floor 9750 140 <sup>th</sup> Street, Surrey
604-984-5775	<b>Lions Gate Hospital</b> Medical Imaging, Lower Level 231 East 15 <sup>th</sup> Street, North Vancouver
604-278-9711	<b>Richmond Hospital</b> Medical Imaging, Main Floor 7000 Westminster Hwy, Richmond
604-520-4640	<b>Royal Columbian Hospital</b> Medical Imaging, Columbia Tower 330 E. Columbia Street, New Westminster
604-806-8006	<b>St. Paul's Hospital</b> Medical Imaging, 2 <sup>nd</sup> Floor, Providence Building 1081 Burrard Street, Vancouver
604-588-3308	<b>Surrey Memorial Hospital</b> Medical Imaging, 1 <sup>st</sup> Floor, Lower Level 13750 96 <sup>th</sup> Avenue, Surrey
604-822-7076	<b>UBC Hospital</b> Medical Imaging, Main Floor 2211 Westbrook Mall, Vancouver
604-875-4111 Ext 68612	<b>Vancouver General Hospital</b> Interventional Radiology, Jim Pattison Pavilion Station 4, Ground Floor 855 West 12 <sup>th</sup> Avenue, Vancouver

www.fraserhealth.ca - www.vch.ca

لا تعد هذه المعلومات بمثابة مشورة طبية، يرجى مراجعة مقدم الرعاية الصحية  
خاصتك.

November 2018 FH Catalogue # 264660 Arabic  
VCH Catalogue # EC.300.A54.AR

### كيف يمكنني الاعتناء بنفسى في المنزل؟

بادر بمتابعة تناول الادوية الاعتيادية الخاصة بك ما لم يطلب من الطبيب عكس ذلك.

الاكثر من تناول السوائل.

العودة الى نظامك الغذائي الطبيعي.

عدم ممارسة أي تمارين رياضية أو رفع أي ثقل لمدة يومين على الاقل.

عدم التدخين لمدة ٢٤ ساعة على الاقل

الإلتصال بالطبيب الذي طلب هذا الاجراء وترتيب موعد للمتابعة.

### متى يمكنني طلب المساعدة؟

في حال لاحظت وجود نزيف في منطقة الجرح، يجب عليك:

- الاستلقاء.
  - الضغط جيداً على منطقة تبعد عن مكان النزيف بـ ١ أو ٢ سنتيمتر (بوصة واحدة) ولمدة ١٥ دقيقة.
  - وفي حال لم يتوقف النزيف يرجى الاتصال بالرقم ٩١١.
- في حال كان لديك اي من هذه العوارض يرجى الاتصال بطبيبك فوراً:

- اي تغيير في لون او حرارة منطقة الجرح
- نزيف في منطقة الجرح
- تخدير أو برودة أو تغير لون الذراع او اليد او الساق في المكان الذي تم فيه إدخال القثطار
- تعدي حرارة الجسم لاكثر من ٣٨,٥ درجة مئوية (١٠١ فهرنهايت)

### هيلث لينك بي سي (الرابط الصحي في بي سي) ٨١١

يرجى الاتصال بهذا الرقم في حال كان لديك اي اسئلة او استفسارات وفي أي وقت كان.

رقم هيلث لينك بي سي متوفر على مدار ٢٤ ساعة. تتوفر هذه الخدمة في ١٣٠ لغة. للحصول على مترجم، يمكنك لفظ لغتك باللغة الانجليزية والانتظار للتحدث مع المترجم.

## ما هو تصوير الأوعية؟

تصوير الأوعية هو عملية فحص الشرايين والأوردة باستخدام الأشعة السينية يتم خلالها حقن مادة ظليلة (صباغ) في جسمك للمساعدة على رؤية الشرايين والأوردة بشكل واضح. وتسمى هذه العملية الصورة الوعائية.

## من يقوم بالصورة الوعائية؟

يقوم طبيب الأشعة بالصورة الوعائية (وهو طبيب متخصص في إجراءات التصوير الموجه).

## هل يمكنني اصطحاب أحد الأقارب أو الأصدقاء؟

نعم، يمكن لأحد الأقارب أو الأصدقاء البقاء معك قبل وبعد عملية التصوير، ولكن لا يمكنهم البقاء أثناء عملية التصوير في الغرفة وذلك للحفاظ على السلامة والتقييد بالتعليمات. كما سيتم إعلامك بمكان الانتظار المخصص لأفراد عائلتك.

## ماذا يحدث قبل هذا الإجراء؟

يقوم قسم التصوير الطبي بالاتصال بك وتزويدك بالارشادات المحددة وكيفية الاستعداد لهذا الإجراء.

**يجب ان يكون برفقتك "شخص بالغ" من أجل مصاحبتك أو إعادتك بالسيارة الى المنزل بعد العملية.**

في حال كان لديك اي اسئلة حول هذا الإجراء، يمكنك التواصل مع طبيب الأشعة قبل عملية التصوير.

## كم تستغرق مدة التصوير؟

يتم ابلاغك من قبل طبيب الأشعة بالوقت الذي يستغرقه هذا الإجراء. عندما تصبح جاهزاً للذهاب الى المنزل سوف يتم الاتصال بالشخص الذي يرافقك.

## ماذا يجري أثناء عملية التصوير الوعائي؟

يتم ادخال محقن وريدي بأحد اوردة الذراع وذلك لاعطاء أي مسكن الألم الذي قد يتسببه هذا الإجراء واذا دعت الحاجة الى ذلك.

كما يتم تشبيك جهاز مراقبة القلب وضغط الدم الى جسمك.

يقوم طبيب الأشعة بحقن مخدر وذلك لتجميد منطقة الفخذ او المعصم بحيث يتم ادخال قثطار (أنبوب مرن طويل ودقيق).

يقوم طبيب الأشعة بعمل شق صغير في الجلد في منطقة الفخذ او المعصم.

يتم وضع القثطار (الانبوب) في الوريد او الشريان عبر هذا الشق ويتم تحريكه في المنطقة التي يجب فحصها.

يتم حقن صبغ الأشعة عدة مرات في الجسم عن طريق القثطار خلال عملية التصوير.

## هل عملية التصوير الوعائي مؤلمة؟

قد تشعر بلسعة أو حرق خلال عملية حقن المخدر. يمكننا تزويدك بمسكن أو مخفف للألم اذا استدعى الامر لذلك.

قد تشعر بالدفئ او حرارة في الوجه عند حقن الصبغ في جسمك وهذا أمر طبيعي. لذا يرجى اعلامنا في حال انزعاجك في اي وقت خلال هذا الإجراء.

بعد عملية التصوير الوعائي، قد تشعر بالتقدم في المنطقة التي تم فحصها وادخال القثطار (الانبوب) اليها.

## ماذا يحدث بعد هذه العملية؟

يقوم طبيب الأشعة بسحب القثطار (الانبوب) وبالضغط على المنطقة مكان ادخال القثطار وذلك لتجنب اي نزيف وقد نستخدم ضمادات او جهاز للضغط.

سنقوم بنقلك الى غرفة الانعاش بحيث يتم الاعتناء بصحتك من قبل الممرض/ة. تترواح مدة الانعاش بين ساعتين الى ست ساعات وذلك بحسب المنطقة التي تم ادخال القثطار اليها وطبيعة هذا الإجراء الطبي.

## هل هناك اي مخاطر او مضاعفات؟

كأي إجراء طبي، هناك احتمال حدوث بعض المضاعفات، وبشكل عام عند حدوث ثقب أو جرح في الجلد هناك احتمال حدوث عدوى.

وتشمل المضاعفات الغير متوقعة:

- نزيف او التهاب في مكان الشق

- نزيف او انسداد او تخثر في الشرايين او الأوردة التي تم فحصها أو في أي مكان اخر من جسمك

- حساسية تجاه صبغ الأشعة

قد تحدث مضاعفات تهدد بحياتك ولكنها نادرة جداً.

## كيف يمكنني الاعتناء بمنطقة الجرح؟

يمكنك ازالة الضمادة عن منطقة الجرح بعد يوم من عمل الإجراء الطبي.

يمكنك الاستحمام بعد ازالة الضمادات.