Arabic

# تصوير الاوعية/ الصورة الوعائية
# Angiography/ Angiogram



## كيف يمكنني الاعتناء بنفسي في المنزل؟

بادر بمتابعة تناول الادوية الاعتيادية الخاصة بك ما لم يطلب من الطبيب عكس ذلك.

الاكثار من تناول السوائل.

العودة الى نظامك الغذائي الطبيعي.

**عدم** ممارسة أي تمارين رياضية أو رفع أي ثقل لمدة يومين على الاقل.

**عدم** التدخين لمدة ٢٤ ساعة على الاقل

الإتصال بالطبيب الذي طلب هذا الاجراء وترتيب موعد للمتابعة.

## متى يمكنني طلب المساعدة؟

**في حال لاحظت وجود نزيف في منطقة الجرح**، يجب عليك:

- الاستلقاء.
- الضغط جيداً على منطقة تبعد عن مكان النزيف بـ ١ أو ٢ سنتمتر (بوصة واحدة) ولمدة ١٥دقيقة.
- وفي حال لم يتوقف النزيف يرجى الاتصال بالرقم ٩١١.

في حال كان لديك اي من هذه العوارض يرجى الاتصال بطبيبك فوراً :

- اي تغيير في لون او حرارة منطقة الجرح
- نزيف في منطقة الجرح
- تخدير أو برودة أو تغير لون الذراع او اليد او الساق في المكان الذي تم فيه إدخال القثطار
- تعدي حرارة الجسم لاكثر من ٣٨,٥ درجة مئوية (١٠١ فهرنهايت)

**هيلث لينك بي سي (الرابط الصحي في بي سي)** ٨١١

يرجى الاتصال بهذا الرقم في حال كان لديك اي اسئلة او استفسارات وفي أي وقت كان.

رقم هيلث لينك بي سي متوفر على مدار ٢٤ ساعة. تتوفر هذه الخدمة في ١٣٠ لغة. للحصول على مترجم، يمكنك لفظ لغتك باللغة الانجليزية والانتظار للتحدث مع المترجم.

## المواقع

| | |
|---|---|
| **Abbotsford-Regional Hospital**<br>Medical Imaging 2nd Floor, Fraser Wing<br>32900 Marshall Road, Abbotsford | 604-851-4866 |
| **Burnaby Hospital**<br>Medical Imaging, 3rd Floor<br>3935 Kincaid Street, Burnaby | 604-434-4211 |
| **Jim Pattison Outpatient Care and Surgery Centre**<br>Medical Imaging, 2nd Floor<br>9750 140th Street, Surrey | 604-533-3308<br>Ext. 63926 |
| **Lions Gate Hospital**<br>Medical Imaging, Lower Level<br>231 East 15th Street, North Vancouver | 604-984-5775 |
| **Richmond Hospital**<br>Medical Imaging, Main Floor<br>7000 Westminster Hwy, Richmond | 604-278-9711 |
| **Royal Columbian Hospital**<br>Medical Imaging, Columbia Tower<br>330 E. Columbia Street, New Westminster | 604-520-4640 |
| **St. Paul's Hospital**<br>Medical Imaging, 2nd Floor, Providence Building<br>1081 Burrard Street, Vancouver | 604-806-8006 |
| **Surrey Memorial Hospital**<br>Medical Imaging, 1st Floor, Lower Level<br>13750 96th Avenue, Surrey | 604-588-3308 |
| **UBC Hospital**<br>Medical Imaging, Main Floor<br>2211 Westbrook Mall, Vancouver | 604-822-7076 |
| **Vancouver General Hospital**<br>Interventional Radiology, Jim Pattison Pavilion<br>Station 4, Ground Floor<br>855 West 12th Avenue, Vancouver | 604-875-4111<br>Ext 68612 |

www.fraserhealth.ca - www.vch.ca

لا تعد هذه المعلومات بمثابة مشورة طبية، يرجى مراجعة مقدم الرعاية الصحية خاصتك.

July 2022 FH Catalogue # 264660 Arabic
VCH Catalogue # EC.300.A54.AR

**ما هو تصوير الأوعية؟**

تصوير الأوعية هو عملية فحص الشرايين والاوردة باستخدام الاشعة السينية يتم خلالها حقن مادة ظليلة (صباغ) في جسمك للمساعدة على رؤية الشرايين والاوردة بشكل واضح. وتسمى هذه العملية الصورة الوعائية.

**من يقوم بالصورة الوعائية؟**

يقوم طبيب الاشعة بالصورة الوعائية (وهو طبيب متخصص في اجراءات التصوير الموجه).

**هل يمكنني اصطحاب أحد الاقارب او الأصدقاء؟**

نعم، يمكن لأحد الاقارب او الاصدقاء البقاء معك قبل وبعد عملية التصوير، ولكن لا يمكنهم البقاء أثناء عملية التصوير في الغرفة وذلك للمحافظة على السلامة والتقيد بالتعليمات. كما سيتم إعلامك بمكان الانتظار المخصص لافراد عائلتك.

**ماذا يحدث قبل هذا الاجراء؟**

يقوم قسم التصوير الطبي بالاتصال بك وتزويدك بالارشادات المحددة وكيفية الاستعداد لهذا الاجراء.

**يجب ان يكون برفقتك "شخص بالغ" من أجل مصاحبتك أو إعادتك بالسيارة الى المنزل بعد العملية.**

في حال كان لديك اي اسئلة حول هذا الاجراء، يمكنك التواصل مع طبيب الاشعة قبل عملية التصوير.

**كم تستغرق مدة التصوير؟**

يتم ابلاغك من قبل طبيب الاشعة بالوقت الذي يستغرقه هذا الاجراء. عندما تصبح جاهزاً للذهاب الى المنزل سوف يتم الاتصال بالشخص الذي يرافقك.

**ماذا يجري أثناء عملية التصوير الوعائي؟**

يتم ادخال محقن وريدي بأحد اوردة الذراع وذلك لاعطاء أي مسكن الالم الذي قد يتسببه هذا الاجراء واذا دعت الحاجة الى ذلك.

كما يتم تشبيك جهاز مراقبة القلب وضغط الدم الى جسمك.

يقوم طبيب الاشعة بحقن مخدر وذلك لتجميد منطقة الفخذ او المعصم بحيث يتم ادخال قثطار (أنبوب مرن طويل ودقيق).

يقوم طبيب الاشعة بعمل شق صغير في الجلد في منطقة الفخذ او المعصم.

يتم وضع القثطار (الانبوب) في الوريد او الشريان عبر هذا الشق ويتم تحريكه في المنطقة التي يجب فحصها.

يتم حقن صباغ الاشعة عدة مرات في الجسم عن طريق القثطار خلال عملية التصوير.

**هل عملية التصوير الوعائي مؤلمة؟**

قد تشعر بلسعة أو حريق خلال عملية حقن المخدر. يمكننا تزويدك بمسكن أو مخفف للألم اذا استدعى الامر لذلك.

قد تشعر بالدفئ او حرارة في الوجه عند حقن الصباغ في جسمك وهذا أمر طبيعي. لذا يرجى اعلامنا في حال انزعاجك في اي وقت خلال هذا الاجراء.

بعد عملية التصوير الوعائي، قد تشعر بالتكدم في المنطقة التي تم فحصها وادخال القثطار (الانبوب) اليها.

**ماذا يحدث بعد هذه العملية؟**

يقوم طبيب الاشعة بسحب القثطار (الانبوب) وبالضغط على المنطقة مكان ادخال القثطار وذلك لتجنب اي نزيف وقد نستخدم ضمادات او جهاز للضغط.

سنقوم بنقلك الى غرفة الانعاش بحيث يتم الاعتناء بصحتك من قبل الممرض/ة. تترواح مدة الانعاش بين ساعتين الى ست ساعات وذلك بحسب المنطقة التي تم ادخال القثطار اليها وطبيعة هذا الإجراء الطبي.

**هل هناك اي مخاطر او مضاعفات؟**

كأي إجراء طبي، هناك احتمال حدوث بعض المضاعفات، وبشكل عام عند حدوث ثقب أو جرح في الجلد هناك احتمال حدوث عدوى.

وتشمل المضاعفات الغير متوقعة:

- نزيف او التهاب في مكان الشق
- نزيف او انسداد او تخثر في الشرايين او الاوردة التي تم فحصها أو في أي مكان اخر من جسمك
- حساسية تجاه صباغ الاشعة

قد تحدث مضاعفات تهدد بحياتك ولكنها نادرة جداً.

**كيف يمكنني الاعتناء بمنطقة الجرح ؟**

يمكنك ازالة الضمادة عن منطقة الجرح بعد يوم من عمل الإجراء الطبي.

يمكنك الاستحمام بعد ازالة الضمادات.



يتبع...