

如何在家中照顾自己

除非医生另有指示，否则可恢复服食常用的药物。

喝大量流质。

恢复通常的饮食。

至少两天不要做费力的运动或提举动作。

至少 24 小时不要吸烟。

打电话给要您做这项手术的医生，安排复诊。

何时应寻求帮助

如果您发现插管部位出血：

- 平躺。
- 紧压插管部位上方大约 1 至 2 公分(1 英寸)处 15 分钟。
- 如果出血不止，请致电 911。

如果您有以下任何症状，请立即与医生联系：

- 插管部位的颜色或温度有改变
- 插管部位出血
- 插导管一侧的手臂、手或腿出现麻木、发凉或颜色改变
- 发烧高过摄氏 38.5 度（华氏 101 度）

BC 省健康联线

8-1-1

如有任何问题或疑虑，可随时致电。BC 省健康联线 24 小时开放。可提供 130 种语言的服务。如需口译服务，请用英语说出您的语言，然后等待口译人员来接听电话。


地点

Abbotsford-Regional Hospital Medical Imaging 2 nd Floor, Fraser Wing 32900 Marshall Road, Abbotsford	604-851-4866
Burnaby Hospital Medical Imaging, 3 rd Floor 3935 Kincaid Street, Burnaby	604-434-4211
Jim Pattison Outpatient Care and Surgery Centre Medical Imaging, 2 nd Floor 9750 140 th Street, Surrey	604-533-3308 Ext. 63926
Lions Gate Hospital Medical Imaging, Lower Level 231 East 15 th Street, North Vancouver	604-984-5775
Richmond Hospital Medical Imaging, Main Floor 7000 Westminster Hwy, Richmond	604-278-9711
Royal Columbian Hospital Medical Imaging, Columbia Tower 330 E. Columbia Street, New Westminster	604-520-4640
St. Paul's Hospital Medical Imaging, 2 nd Floor, Providence Building 1081 Burrard Street, Vancouver	604-806-8006
Surrey Memorial Hospital Medical Imaging, 1 st Floor, Lower Level 13750 96 th Avenue, Surrey	604-588-3308
UBC Hospital Medical Imaging, Main Floor 2211 Westbrook Mall, Vancouver	604-822-7076
Vancouver General Hospital Interventional Radiology, Jim Pattison Pavilion Station 4, Ground Floor 855 West 12 th Avenue, Vancouver	604-875-4111 Ext 68612



Chinese Simplified

血管造影术/ 血管造影照片 Angiography/ Angiogram



www.fraserhealth.ca - www.vch.ca

这些信息并不取代医护人员给您的意见。

November 2018 FH Catalogue # 264661 Chinese Simplified
VCH Catalogue # EC.300.A54.CS

什么是血管造影术？

血管造影术是一项借助 X 光来查看身体内动脉和静脉的手术。为帮助看见动脉和静脉，会注射一种 X 光染色剂（又称对比剂）。这称为血管造影照片。

血管造影照片由谁拍摄？

由放射科医生（专门从事影像导引手术的医生）拍摄。

我可以带亲戚或朋友来吗？

可以，在手术前后他们可以陪着您。不过，基于安全和规定等原因，手术期间他们不可在房间内。我们会告诉您，家人可以在哪里等候。

手术前的情形是怎样的？

医学影像科（Medical Imaging Department）会联系您，给您有关如何为手术做准备的具体指示。

您必须安排一位“可靠的成人”在手术后开车送您或陪伴您回家。

对于这项手术，如果您有任何问题，可于手术前向放射科医生咨询。

要花多长时间？

放射科医生会告诉您大概需要多长时间。当您可以回家时，我们会致电您的联系人。

造影照片拍摄期间的情形是怎样的？

我们会在您的手臂上开始静脉注射，这样，我们可以在您需要时施用止痛药及其他药物，使您松弛。

我们会为您连接上心脏及血压监测器。

放射科医生会注射麻醉剂，使在腹股沟或手腕将会置入一条纤细管子（称为导管）的部位“失去感觉”。

放射科医生会在腹股沟或手腕的皮肤上切开一个小口。

导管会通过切口置入动脉或静脉。导管会被引导到要接受检查的身体部分。

在拍摄 X 光照片期间，会通过导管多次注射 X 光染色剂。

疼吗？

注射麻醉剂时可能会有刺痛或灼痛感。如有需要，我们可施用止痛药或令肌肉松弛的药。

在注射 X 光染色剂时，您可能会感觉到片刻的温热或有面红耳赤的感觉，这是正常的。在手术过程中任何时候如感到不舒服，请务必告诉我们。

在手术后，插导管的部位可能会有触痛和瘀伤。

之后的情形是怎样的？

放射科医生会把导管拿掉。我们会按压导管所在的部位，以控制出血。我们可能会使用压力绷带或加压装置。

我们会把您转移到恢复区，交由一名护士照顾。您会在那里逗留 2 至 6 小时，具体取决于采用的插管部位及手术的范围。

会有风险或并发症吗？

正如其他医疗程序一样，出现并发症是有可能的。任何时候皮肤被刺穿或切开，都会有感染的可能。

预期之外的并发症可能包括：

- 插管部位出血或感染
- 接受检查或身体其他部分的动脉或静脉有出血、阻塞或凝块
- 对 X 光染色剂有过敏反应

出现危及生命的并发症是有可能的，但不常见。

如何护理插管部位？

手术后第二天，把插管部位上的绷带拿掉。拿掉绷带之后，您可以淋浴。