如何在家中照顾自己

除非医生另有指示,否则可恢复服食常用 的药物。

喝大量流质。

恢复通常的饮食。

至少两天不要做费力的运动或提举动作。

至少24小时不要吸烟。

打电话给要您做这项手术的医生, 安排复 诊。

何时应寻求帮助

如果您发现插管部位出血:

- 平躺。
- 紧压插管部位上方大约1至2公分(1英寸) 处 15 分钟。
- 如果出血不止, 请致电 911。

如果您有以下任何症状,**请立即与医生联** 系:

- 插管部位的颜色或温度有改变
- 插管部位出血
- 插导管一侧的手臂、手或腿出现麻木、 发凉或颜色改变
- 发烧高过摄氏 38.5 度(华氏 101 度)

BC 省健康联线

8-1-1

如有任何问题或疑虑,可随时致电。BC 省健康联线 24 小时开放。可提供 130 种语言的服务。如需口译 服务,请用英语说出您的语言,然后等待口译人员 来接听电话。

抽占

地 从		
	Abbotsford-Regional Hospital Medical Imaging 2 nd Floor, Fraser Wing 32900 Marshall Road, Abbotsford	604-851-4866
	Burnaby Hospital Medical Imaging, 3 rd Floor 3935 Kincaid Street, Burnaby	604-434-4211
	Jim Pattison Outpatient Care and Surgery Centre Medical Imaging, 2 nd Floor 9750 140 th Street, Surrey	604-533-3308 Ext. 63926
	Lions Gate Hospital Medical Imaging, Lower Level 231 East 15 th Street, North Vancouver	604-984-5775
	Richmond Hospital Medical Imaging, Main Floor 7000 Westminster Hwy, Richmond	604-278-9711
	Royal Columbian Hospital Medical Imaging, Columbia Tower 330 E. Columbia Street, New Westminster	604-520-4640
	St. Paul's Hospital Medical Imaging, 2 nd Floor, Providence Bui 1081 Burrard Street, Vancouver	604-806-8006 ilding
	Surrey Memorial Hospital Medical Imaging, 1 st Floor, Lower Level 13750 96 th Avenue, Surrey	604-588-3308

www.fraserhealth.ca - www.vch.ca

Interventional Radiology, Jim Pattison Pavilion Ext 68612

这些信息并不取代医护人员给您的意见。

July 2022

UBC Hospital

Medical Imaging, Main Floor

Station 4, Ground Floor

2211 Westbrook Mall, Vancouver

Vancouver General Hospital

855 West 12th Avenue, Vancouver

FH Catalogue # 264661 Chinese Simplified VCH Catalogue # EC.300.A54.CS

604-822-7076

604-875-4111










Chinese Simplified

血管造影术/ 血管造影照片 Angiography/ **Angiogram**



什么是血管造影术?

血管造影术是一项借助 X 光来查看身体内动脉和静脉的手术。为帮助看见动脉和静脉,会注射一种 X 光染色剂(又称对比剂)。这称为血管造影照片。

血管造影照片由谁拍摄?

由放射科医生(专门从事影像导引手术的 医生)拍摄。

我可以带亲戚或朋友来吗?

可以,在手术前后他们可以陪着您。不过,基于安全和规定等原因,手术期间他们不可在房间内。我们会告诉您,家人可以在哪里等候。

手术前的情形是怎样的?

医 学 影 像 科 (Medical Imaging Department)会联系您,给您有关如何为 手术做准备的具体指示。

您必须安排一位"可靠的成人"在手术后 开车送您或陪伴您回家。

对于这项手术,如果您有任何问题,可于 手术前向放射科医生咨询。

要花多长时间?

放射科医生会告诉您大概需要多长时间。 当您可以回家时,我们会致电您的联系人。

造影照片拍摄期间的情形是怎样的?

我们会在您的手臂上开始静脉注射,这样, 我们可以在您需要时施用止痛药及其他药物, 使您松弛。

我们会为您连接上心脏及血压监测器。

放射科医生会注射麻醉剂,使在腹股沟或手腕将会置入一条纤细管子(称为导管)的部位"失去感觉"。

放射科医生会在腹股沟或手腕的皮肤上切开一个小口。

导管会通过切口置入动脉或静脉。导管会被引导到要接受检查的身体部分。

在拍摄 X 光照片期间,会通过导管多次注射 X 光染色剂。

疼吗?

注射麻醉剂时可能会有刺痛或灼痛感。如有 需要,我们可施用止痛药或令肌肉松弛的药。

在注射 X 光染色剂时,您可能会感觉到片刻的温热或有面红耳赤的感觉,这是正常的。 在手术过程中任何时候如感到不舒服,请务必告诉我们。

在手术后,插导管的部位可能会有触痛和 瘀伤。

之后的情形是怎样的?

放射科医生会把导管拿掉。我们会按压导管所在的部位,以控制出血。我们可能会使用压力绷带或加压装置。

我们会把您转移到恢复区,交由一名护士 照顾。您会在那里逗留2至6小时,具体取 决于采用的插管部位及手术的范围。

会有风险或并发症吗?

正如其他医疗程序一样,出现并发症是有可能的。任何时候皮肤被刺穿或切开,都 会有感染的可能。

预期之外的并发症可能包括:

- 插管部位出血或感染
- 接受检查或身体其他部分的动脉或 静脉有出血、阻塞或凝块
- 对 X 光染色剂有过敏反应

出现危及生命的并发症是有可能的,但不常见。

如何护理插管部位?

手术后第二天,把插管部位上的绷带拿掉。 拿掉绷带之后,您可以淋浴。