如何在家中照顧自己？

除非醫生另有指示，否則可恢復服食常用的藥物。

喝大量流質。

恢復通常的飲食。

至少兩天**不可**做費力的運動或提舉動作。

至少 24 小時**不可**吸煙。

致電那位囑咐要做這項手術的醫生，安排覆診。

何時求助

如察覺插管部位**流血：**

- 放平身體躺下。
- 緊壓插管部位對上大約 1 至 2 公分(1 吋)處 15 分鐘。
- 如流血不止，就要致電 9-1-1。

如有以下的情況，就要**馬上致電醫生：**

- 插管部位的顏色或溫度有改變
- 插管部位出血
- 插導管的手臂、手或腿出現麻木、發涼或顏色改變
- 發燒高過攝氏 38.5 度(華氏 101 度)

卑詩健康結連(HealthLinkBC) **8-1-1**

如有什麼問題或憂慮，可隨時致電。卑詩健康結連是 24 小時可用。以 130 種語言提供服務。如需要傳譯員，可用英語說出您的語言，然後等到傳譯員來接聽電話。

地點

Abbotsford-Regional Hospital Medical Imaging 2nd Floor, Fraser Wing 32900 Marshall Road, Abbotsford	604-851-4866
Burnaby Hospital Medical Imaging, 3rd Floor 3935 Kincaid Street, Burnaby	604-434-4211
Jim Pattison Outpatient Care and Surgery Centre Medical Imaging, 2nd Floor 9750 140th Street, Surrey	604-533-3308 Ext. 63926
Lions Gate Hospital Medical Imaging, Lower Level 231 East 15th Street, North Vancouver	604-984-5775
Richmond Hospital Medical Imaging, Main Floor 7000 Westminster Hwy, Richmond	604-278-9711
Royal Columbian Hospital Medical Imaging, Columbia Tower 330 E. Columbia Street, New Westminster	604-520-4640
St. Paul's Hospital Medical Imaging, 2nd Floor, Providence Building 1081 Burrard Street, Vancouver	604-806-8006
Surrey Memorial Hospital Medical Imaging, 1st Floor, Lower Level 13750 96th Avenue, Surrey	604-588-3308
UBC Hospital Medical Imaging, Main Floor 2211 Westbrook Mall, Vancouver	604-822-7076
Vancouver General Hospital Interventional Radiology, Jim Pattison Pavilion Station 4, Ground Floor 855 West 12th Avenue, Vancouver	604-875-4111 Ext 68612

www.fraserhealth.ca - www.vch.ca

這些資料並不取代醫護人員給您的意見。

July 2022 FH Catalogue # 264662 Chinese Traditional
VCH Catalogue # EC.300.A54.CN

fraserhealth | Providence HEALTH CARE How you want to be treated. | Provincial Health Services Authority Province-wide solutions. Better health. | Vancouver CoastalHealth Promoting wellness. Ensuring care.

Chinese Traditional

血管造影術/血管造影照片
Angiography/ Angiogram



何謂血管造影術？

血管造影術是一項借助 X 光來察看身體內動脈和靜脈的手術。為幫助看見動脈和靜脈，會注射一種X光染色劑(稱為對比劑)。這是稱為血管造影照片。

誰負責拍攝血管造影照片？

這是由放射科醫生(專長於影像導引手術的醫生)負責。

我可以帶親戚或朋友來嗎？

可以，在手術前後他們可以陪著您。不過，基於安全和規定等理由，手術期間他們不可在房間內。我們會告訴您，家人可以在何處等侯。

手術前情況會怎麼樣？

醫學影像科(Medical Imaging Department)會聯絡您，給您有關如何為手術做準備的具體指示。

您必須安排一位‘可靠的成人’在手術後開車送您或陪伴您回家。

如有關於這項手術的問題，可於手術前問放射科醫生。

需時多久？

放射科醫生會告訴您大約需時多久。當您準備好回家時，我們會致電您的聯絡人。

拍攝血管造影照片期間情況會怎麼樣？

我們會在您的手臂開始靜脈注射，以便您如需要的話，我們可施用止痛藥及其他藥物，使您鬆弛。

我們會把您連接上心臟及血壓監測器。

放射科醫生會注射麻醉藥，使在腹股溝或手腕那個將會置入一條纖細管子(稱為導管)的部分‘失去感覺’。

放射科醫生會在腹股溝或手腕的皮膚上切開一個小口。

導管會通過切口置入動脈或靜脈。導管會被引導到那個要接受檢查的身體部分。

在拍攝 X 光照片期間，會通過導管多次注射X光染色劑。

痛不痛？

注射麻醉藥時可能會有刺痛或灼痛感。如有需要，我們可施用止痛藥或肌肉鬆弛藥。

在注射 X 光染色劑時，您可能會察覺到片刻的溫熱或面紅耳赤的感覺，這是正常的。在手術期間任何時候如覺得不舒服，務必告訴我們。

在手術後，插導管的部位可能會有點觸痛和瘀傷。

之後情況會怎麼樣？

放射科醫生會把導管拿掉。我們會按壓導管所在的部位，以控制出血。我們可能會用壓力繃帶或加壓裝置。

我們會把您轉移到復甦區，交由一名護士照顧。您會在那裏逗留 2 至 6 小時，視乎所用的插管部位及手術的範圍而定。

會有什麼風險或併發症嗎？

和其他醫療程序一樣，出現併發症是有可能的。任何時候皮膚被刺穿或切開，都會有感染的可能。

意想不到的併發症可能包括：

- 插管部位出血或受感染
- 接受檢查或身體其他部分的動脈或靜脈有出血、阻塞或凝塊
- 對 X 光染色劑有過敏反應

出現危及生命的併發症是有可能的，但機會很微。

如何照顧插管部位？

手術後翌日，把插管部位上的繃帶拿掉。

拿掉繃帶之後，您可以淋浴。

轉背頁...