


Persian

آنژیوگرافی/آنژیوگرام Angiography/ Angiogram



جایگاه‌ها

Abbotsford-Regional Hospital Medical Imaging 2 nd Floor, Fraser Wing 32900 Marshall Road, Abbotsford	604-851-4866
Burnaby Hospital Medical Imaging, 3 rd Floor 3935 Kincaid Street, Burnaby	604-434-4211
Jim Pattison Outpatient Care and Surgery Centre Medical Imaging, 2 nd Floor 9750 140 th Street, Surrey	604-533-3308 Ext. 63926
Lions Gate Hospital Medical Imaging, Lower Level 231 East 15 th Street, North Vancouver	604-984-5775
Richmond Hospital Medical Imaging, Main Floor 7000 Westminster Hwy, Richmond	604-278-9711
Royal Columbian Hospital Medical Imaging, Columbia Tower 330 E. Columbia Street, New Westminster	604-520-4640
St. Paul's Hospital Medical Imaging, 2 nd Floor, Providence Building 1081 Burrard Street, Vancouver	604-806-8006
Surrey Memorial Hospital Medical Imaging, 1 st Floor, Lower Level 13750 96 th Avenue, Surrey	604-588-3308
UBC Hospital Medical Imaging, Main Floor 2211 Westbrook Mall, Vancouver	604-822-7076
Vancouver General Hospital Interventional Radiology, Jim Pattison Pavilion Station 4, Ground Floor 855 West 12 th Avenue, Vancouver	604-875-4111 Ext 68612

در خانه چگونه از خودم مراقبت کنم؟

مصرف داروهای همیشگی خود را از سر بگیرید، مگر آنکه پزشک شما دستور دیگری داده باشد.

مقدار زیادی مایعات بنوشید.

رژیم غذایی همیشگی خود را در پیش بگیرید.

حداقل به مدت دو روز هیچگونه فعالیت بدنی سخت یا بلند کردن اجسام انجام ندهید.

حداقل به مدت 24 ساعت سیگار نکشید.

با پزشکی که عمل آنژیوگرافی را تجویز کرده است برای وقت ملاقات بعدی تماس بگیرید.

چه زمانی درخواست کمک کنم؟

اگر در محل ورود لوله آنژیوگرافی (سوند) متوجه خونریزی شدید:

- روی زمین دراز بکشید.
 - به مدت 15 دقیقه حدوداً 1 تا 2 سانتی‌متر (1 اینچ) بالاتر از محل ورود لوله را محکم فشار دهید.
 - اگر خونریزی متوقف نشد، با 1-9 تماس بگیرید.
- در صورت مشاهده‌ی هر یک از موارد زیر بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید:
- هر تغییری در رنگ یا دمای محل ورود
 - خونریزی از محل ورود
 - بی‌حسی، سرما، یا تغییر رنگ در بازو، دست، یا پا در محلی که سوند وارد شده بود
 - تب بیش از 38/5 درجه‌ی سانتیگراد (101 درجه‌ی فارنهایت)

هلت‌لینک بی‌سی 8-1-1

هر گاه پرسش یا نگرانی داشتید، تماس بگیرید. هلت‌لینک بی‌سی 24 ساعته باز است. دسترسی به 130 زبان. برای درخواست مترجم، نام زبان خود را به انگلیسی بگویید. آنگاه منتظر بمانید تا یک مترجم روی خط بیاید.

www.fraserhealth.ca - www.vch.ca

این اطلاعات جایگزینی برای توصیه‌های مراقبتگر بهداشتی شما نیست.

November 2018 FH Catalogue # 264663 Persian
VCH Catalogue # EC.300.A54.FA

آنژیوگرافی چیست؟

آنژیوگرافی شیوه‌ای برای معاینه‌ی سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌های شما با استفاده از پرتوهای ایکس است. برای کمک به دیده شدن سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌ها، یک رنگ پرتو ایکس (به نام کنتراست) تزریق می‌شود. به این کار آنژیوگرام می‌گویند.

چه کسی آنژیوگرام را انجام می‌دهد؟

این کار توسط یک رادیولوژیست انجام می‌شود (پزشکی با تخصص در شیوه‌های عمل پزشکی با هدایت تصویر).

آیا می‌توانم خویشتاوند یا دوستی را همراه خود بیاورم؟

بله، همراهان شما می‌توانند قبل و بعد از عمل همراه شما باشند. البته به دلایل ایمنی و طبق مقررات، آن‌ها نمی‌توانند در حین عمل داخل اتاق باشند. ما به شما خواهیم گفت که اعضای خانواده کجا می‌توانند منتظر بمانند.

قبل از عمل آنژیوگرام چه اتفاقی می‌افتد؟

بخش تصویربرداری پزشکی با شما تماس خواهند گرفت و دستورهای مشخصی در مورد چگونگی آماده‌سازی برای این عمل به شما خواهند داد.

باید هماهنگی لازم را انجام دهید تا پس از عمل، یک «فرد مسئول» شما را به خانه برساند یا رانندگی شما را به عهده بگیرد.

در صورت داشتن هرگونه سوالی درباره‌ی این عمل، قبل از آن از رادیولوژیست بپرسید.

این فرایند چقدر طول می‌کشد؟

رادیولوژیست به شما خواهد گفت که این عمل چقدر طول خواهد کشید. زمانی که برای رفتن به خانه آماده باشید، ما به فردی که برای تماس معرفی کرده‌اید اطلاع خواهیم داد.

در حین آنژیوگرام چه اتفاقی می‌افتد؟

ما یک سرنگ وریدی داخل بازوی شما می‌گذاریم تا در صورتی که نیاز داشته باشید، مسکن و سایر داروها را به شما بدهیم.

ما شما را به یک نمایشگر ضربان قلب و فشار خون وصل می‌کنیم.

رادیولوژیست داروی بی‌حسی را برای «بی‌حس کردن» به ناحیه‌ای از کشاله‌ی ران یا مچ دست تزریق می‌کند که در آنجا لوله‌ای نازک به نام سوند (کاتتر) قرار داده خواهد شد.

رادیولوژیست برش کوچکی در پوست کشاله‌ی ران یا مچ دست ایجاد می‌کند.

سوند از طریق این برش وارد یک سرخرگ یا سیاهرگ می‌شود. سوند به بخشی از بدن هدایت می‌شود که باید آزمایش شود.

از طریق سوند چندین مرتبه رنگ پرتو ایکس تزریق می‌شود و در همان حال عکس‌های پرتو ایکس گرفته می‌شود.

آیا درد هم دارد؟

در حین تزریق داروی بی‌حسی، ممکن است احساس سوزش یا گزش کنید. اگر نیاز باشد، ما می‌توانیم از داروهای مسکن یا آرام‌بخش استفاده کنیم.

ممکن است در هنگام تزریق رنگ پرتو ایکس احساس گرما یا برافروختگی لحظه‌ای بکنید. این حالت طبیعی است. حتماً در صورتی که در هر زمانی از این عمل احساس ناخوشایندی داشتید، به ما بگویید.

پس از انجام این عمل ممکن است در محل ورود سوند کمی درد یا کبودی داشته باشید.

بعد از عمل چه اتفاقی می‌افتد؟

رادیولوژیست سوند را برمی‌دارد. ما بر محل سوند فشار وارد می‌کنیم تا هر گونه خونریزی احتمالی را کنترل کنیم. ممکن است از باند یا ابزاری برای فشار آوردن استفاده کنیم.

آنگاه شما را به بخش ریکاوری می‌بریم که پرستاری در آنجا از شما مراقبت خواهد کرد. بسته به محل ورود سوند و دامنه‌ی عمل، شما بین 2 تا 6 ساعت در بخش ریکاوری می‌مانید.

آیا هیچ‌گونه خطر یا عوارضی وجود دارد؟

مانند هر عمل پزشکی دیگری، احتمال عارضه وجود دارد. هر بار که پوست سوراخ یا بریده می‌شود، احتمال عفونت وجود دارد.

عوارض غیرمنتظره می‌تواند شامل این موارد باشد:

- خونریزی یا عفونت در محل ورود
- خونریزی، انسداد، یا لخته شدن در سرخرگ‌ها یا سیاهرگ‌های تحت آزمایش یا در سایر نقاط بدن
- واکنش حساسیتی به رنگ پرتو ایکس

عوارض مرگبار هم محتمل هستند، اما به ندرت رخ می‌دهند.

چگونه از محل ورود سوند در بدن خود مراقبت کنم؟

روز پس از عمل، باند را از روی محل ورود لوله بردارید.

پس از برداشتن باند، می‌توانید دوش بگیرید.