Korean

사람과 동물에게 물린 상처 Animal and Human Bites

사람과 동물에게 물린 상처는 기타 상처보다 감염될 가능성이 더 큽니다. 동물과 사람의 입에는 다양한 세균(균)이 존재합니다.

대개 물린 상처(얼굴과 목 예외)는 열린 상태로 두고 꿰매지(봉합하지) 않습니다. 이렇게 하면 감염 가능성을 줄이는 데 도움이 됩니다. 상처 부위는 나중에 아물 수도 있습니다.

동물의 종류와 물린 방법에 따라 광견병 예방 약을 드릴 수도 있습니다.

가정에서 자신을 돌보는 방법

- 상처 부위를 청결하게 유지하십시오. 상처 부위를 비누와 빠르게 흐르는 물로 세척하십시오.
- 상처에 붕대를 했다면 깨끗하고 건조하게 관리하십시오. 젖거나 더러워진 붕대는 매일 갈아주십시오.
- 항생제 처방전을 드릴 수도 있습니다. 항생제를 복용해야 한다면 처방전으로 약을 조제받아 지시대로 정확히 복용하십시오. 항생제를 끝까지 다 복용하셔야 합니다 – 감염 징후가 사라졌다 해도.
- 통증이 있거나 불편하면 처방전 없이 구입하는 아세트아미노펜(타이레놀 또는 스토어 브랜드)이나 이부프로펜(애드빌, 모트린, 또는 스토어 브랜드) 같은 진통제를 복용하십시오.

도움을 요청해야 하는 상황

다음 증상이 나타나면 가정의를 만나거나 워크인 클리닉에 가십시오.

- ☐ 상처 부위에 빨개짐이나 부기가 심해짐
- ☐ 상처의 통증이 심해짐
- ☐ 상처에서 황색이나 녹색의 진물(고름)이 나옴
- ☐ 상처에서 악취가 남
- ☐ 38.5°C(101.3°F)가 넘는 고열

자세한 사항은 다음에 문의하십시오

- 가정의
- HealthLinkBC - 8-1-1(청각 장애인 7-1-1)로 전화하시거나 www.HealthLinkBC.ca 를 보십시오.

밴쿠버 코스탈 보건 공단(Vancouver Coastal Health)의 허가를 받고 'EB.100.An54 Animal and Human Bites'(2012 년 3 월)를 수정함

이 문서에 담긴 정보는 의료팀이 이를 제공한 해당 환자만을 위한 것입니다.

Catalogue # 264558 (January 2015) Korean
To order: https://patienteduc.fraserhealth.ca