

Animal and Human Bites

گاز گرفته شدن انسان و حیوان

چه موقع کمک بخواهیم

در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر به پزشک خانواده خود و یا به واک-این-کلینیک مراجعه کنید:

افزایش قرمزی و تورم در اطراف زخم

افزایش درد و سوزش زخم

ترشح غلیظ زرد یا سبز از زخم (چرک)

بوی بد از زخم

تب بیشتر از 38.5°C (101.3°F)

احتمال عفونی شدن زخم ناشی از گاز گرفته شدن انسان و حیوان، بیشتر از سایر زخمها میباشد. در دهان انسان و حیوانات میکروب های (موجودات زنده) بسیاری موجود است .

معمولا زخمهای ناشی از گاز گرفتگی (بجز در ناحیه صورت و گردن) را باز گذاشته و آنها را بخیه نمیزنند. این زخمها ممکن است بعدا بخیه زده شوند.

بسته به چگونگی گاز گرفته شدن، ممکن است به شما داروی ضد هاری بدهیم.

چگونه از خود در منزل مراقبت کنید

- زخم را تمیز نگه دارید. با آب جاری و صابون محل زخم را بشوئید.
- اگر روی زخمتان با باند پانسمان شده است، آنرا تمیز و خشک نگه دارید. باند را هر روز و زمانیکه خیس یا کثیف شده باشد تعویض کنید.
- ممکن است به شما نسخه ای برای آنتی بیوتیک بدهیم. اگر لازم به خوردن آنتی بیوتیک باشد، دارو را با نسخه تهیه و دقیقا طبق دستور پزشک مصرف نمایند. اطمینان حاصل کنید تا اتمام دارو به مصرف آن ادامه دهید - حتی اگر علائم عفونت از بین رفته باشد.
- اگر درد یا ناراحتی دارید، از مسکن هائی که بدون نسخه پزشک قابل خریداری هستند مانند استامینوفن (تایلنول، یا داروهای مشابه با مارک فروشگاهی) یا ایبوپروفن (ادویل، موتترین یا داروهای مشابه با مارک فروشگاهی) استفاده کنید.

برای آنکه بیشتر بدانید خوب است سوال کنید:

- از پزشک خانواده خود
- با هلت لینک بی . سی به شماره 1-1-8 تماس بگیرید، (با شماره 1-1-7 برای ناشنویان و یا کم شنوایان) و یا به آدرس اینترنتی: www.HealthLinkBC.ca مراجعه کنید.

برگرفته از 'EB.100.An54 Animal and Human Bites' (مارچ 2012) با کسب اجازه از ونکوور کستال هلت

www.fraserhealth.ca

اطلاعاتی که در اینجا مشاهده میکنید تنها برای شخصی که از طرف گروه مراقبین بهداشتی این برگه به او عرضه میگردد، در نظر گرفته شده است.