

## ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਢੇ ਗਏ ਚੱਕ **Animal and Human Bites**

ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਢੇ ਗਏ ਚੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਾਗ (ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ) ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਣੂ (ਜੀਵ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਕ ਦੇ ਜ਼ਖਮ (ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਧੌਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ), ਖੁਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕ ਵੱਢਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਰੋਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

### ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ

- ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਖਮ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖੋ। ਪੱਟੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗਿੱਲੀ ਜਾਂ ਮਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।
- ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਲਈ ਨੁਸਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਚੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈ ਲਓ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ ਭਾਵ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ।
- ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈ ਲਓ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਦੇ ਬਗ਼ੈਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੇਟਾਮੀਨੋਫ਼ਿਨ (ਟਾਇਲਨੋਲ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡ) ਜਾਂ ਆਈਬੋਪ੍ਰੋਫ਼ਿਨ (ਐਡਵਿਲ, ਮੋਰਟਿਨ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡ)।

### ਮਦਦ ਕਦੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਕ ਇਨ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ:

- ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਵਧਣਾ
- ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਪੀੜ ਜਾਂ ਅਕੜਾਓ ਦਾ ਵਧਣਾ
- ਜ਼ਖਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਲੇ ਜਾਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗਾੜ੍ਹਾ ਤਰਲ ਰਿਸਣਾ(ਪੱਸ)
- ਜ਼ਖਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣਾ
- 38.5° ਸੈ (101.3° ਫ਼) ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਖਾਰ

### ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਪੁੱਛਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ:

- ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ
- ਹੈਲਥਲਿੰਕ ਬੀਸੀ- 8-1-1 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ (ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 7-1-1 ਕਰੋ) ਜਾਂ ਆੱਨ ਲਾਈਨ [www.HealthLinkBC.ca](http://www.HealthLinkBC.ca) 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ 'ਈਥੀ.100ਐਨ54 ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਢੇ ਗਏ ਚੱਕ' (ਮਾਰਚ2012) ਤੋਂ ਰਪਾਂਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।