

使用醫療程序鎮靜劑之前(兒童)

Chinese Traditional

Before Procedural Sedation (Child)

兒童對測試檢查、治療或其他醫療程序可能會感到害怕。孩子在接受醫療程序期間,或需靠藥物幫助他們放鬆、平靜下來和固定身體位置,我們稱這些藥物為醫療程序鎮靜劑。若知道某項醫療程序可能引致痛楚,亦會用藥物幫助減輕痛楚。

孩子是否需要使用鎮靜劑,是由醫生來決定。鎮靜 劑可以是口服、經鼻孔施藥、注射入肌肉或透過靜 脈血管注入體內。

請使用這份資料協助孩子為醫療程序做好準備。

解釋醫療程序

Explaining the procedure

如實告訴孩子相關的程序資訊,因為在知道真實情況後,他們會少些焦慮和恐懼。向他們解釋:施藥時他們會感到有睡意或覺得有點奇怪、誰人會陪伴在旁、會發生什麼事、進行程序期間和之後的感覺會是怎樣。大多數小朋友都記不起醫療程序的細節。若您想由醫護團隊向孩子解釋,團隊可以提供協助。

若您在醫療程序期間陪伴在孩子身邊,您可以從旁輕柔地安撫他們,建議他們想著或幻想一些愉快的事情,例如自己身在海灘、去旅行或想著自己喜愛的寵物。

醫療程序鎮靜劑可能引致的副作用 Possible effects of procedural sedation

程序進行期間:

- 孩子的呼吸可能會減慢。
- 孩子的血壓可能會降低。

這是正常情況。在程序進行期間,我們會全程密切 監察孩子的狀況。

孩子在完成程序後逐漸醒來時,或會:

- 感到胃部不適(作嘔)
- 嘔吐
- 表現煩躁、不開心或流淚
- 感到睏倦、頭暈或行動不穩
- 發惡夢

為孩子安全起見 For your child's safety

我們安排一名護士在孩子接受程序之前、期間和之後 都陪伴在側,直至孩子醒過來和身體回復正常為止。 護士密切監察孩子的情況和鎮靜劑的影響。護士檢查 孩子的心跳、呼吸、血壓和血液含氧量,若察覺有任 何問題,即立刻通知醫生。

如何助孩子做好事前準備 How to prepare your child

做醫療程序 6 小時前,**停止**給孩子<u>喝奶和吃固體食物</u>。做醫療程序 4 小時前,**停止**餵孩子喝<u>母乳</u>。孩子可以喝清水或清澈的蘋果汁。

做醫療程序2小時前,停止飲用所有液體。

www.fraserhealth.ca

本資訊不替代醫護人員為您提供的建議。

開始程序前 Before we begin the procedure

- 我們確保已準備好所有必要設備。
- 我們將一個儀器放在孩子的手指或腳趾上。這個儀器全程都在量度孩子的血液含氧量。
- 我們或會將兩條塑膠軟管放進孩子的鼻孔。軟 管連接一個機器,用來監察孩子的呼吸情況。
- 有時我們會在孩子的手部或腳部以靜脈注射 方式施藥。
- 我們或會將一些連著導線的小貼紙貼在孩子 胸口上。這些導線是連接心臟監察器的。
- 我們將一些特別的藥物放在孩子床邊。如有需要,我們給孩子服用這些藥物,以逆轉鎮 靜劑和止痛藥的副作用。其實我們是極少需要使用這些特別藥物的。

程序進行期間 During the procedure

對於大部份的醫療程序,您可以預期房間內有最少三名專業人員:

- 執行程序的醫生。
- 時刻在監察孩子呼吸狀況的專業醫護人員。此人可以是麻醉師、呼吸治療師或護士。
- 每5分鐘檢查孩子狀況一次的護士。檢查項目如下:
 - 孩子的麻醉情況
 - 孩子的血液含氧水平
 - 孩子的心跳率和呼吸率
 - 孩子的血壓

孩子可能會流口水,因此我們或需抽出口水避免 有窒息危險。

孩子的眼睛可能維持張開,看來像是醒著的,但 其實只是處於一種睡夢狀態。您可以跟孩子說 話,協助他們專心想著愉快夢境。

程序進行期間,我們建議孩子只由一名家長或照顧者陪同。若您在任何時候感到不安,也可以隨時離開。

剛完成程序後 Right after the procedure

護士一直密切監察孩子的情況,直至他們完 全清醒和回復正常行為為止。護士繼續檢查 孩子的心跳、呼吸、血壓、血液含氧水平和 他們的清醒程度。 孩子逐漸醒來時,可能對光線和嘈聲較為敏感。 您可以輕聲地跟他們說話,輕柔地觸摸他們,令 他們想著開心的夢境,這有助他們慢慢地甦醒過來。

www.fraserhealth.ca

本資訊不替代醫護人員為您提供的建議。



使用醫療程序鎮靜劑之後(兒童)After Procedural Sedation (Child)

所用藥物的詳情
孩子的體重:
日期及時間:
施用的鎮靜劑:
施藥份量:
施藥方法:
□□服
□ 經鼻孔
□ 肌肉注射
□ 靜脈注射
照顧孩子的特定指示
密切觀察孩子情況最少 24 小時或直至
按照醫護團隊的指示給孩子服用止痛藥。
如有問題或疑慮・致電:
醫生:
電話號碼:
向菲沙衛生局虛擬醫護服務的護士查詢
一星期七天每天早上 10 時至晚上 10 時
電話: 1-800-314-0999
網上即時諮詢:fraserhealth.ca/virtualcare
在辦公時間以外,向卑詩健康連線
(HealthLinkBC) 的護士查詢。
電話:8-1-1
提供 130 種語言選擇。如要求傅譯員服務,請田茁語

孩子符合以下情況,即可以準備回家:

- 他們已完全清醒或已回復接受藥物前的狀態。
- 他們可以飲少量液體。

藥物的影響通常在數小時內消退,但有些兒童感到不適的時間可長達多至24小時。

藥物的影響導致孩子出現以下任何不良情況也是常見的:

- 幅叶
- 不想進食(胃口不佳)
- 行動不穩或平衡不佳
- 說感到頭量
- 神志混沌或有睡意
- 易怒、煩躁、易哭、不安

回家時 Travelling home

- 可以的話,安排由另一位成年人開車或陪伴 孩子坐車。
- 讓孩子坐在安全汽車座椅或扣安全帶時,須 確保其頭部位置有足夠承托。
- 若孩子睡著了,須不時把他/她叫醒,確保他/她只是淺睡和呼吸暢順。

www.fraserhealth.ca

本資訊不替代醫護人員為您提供的建議。

說出您所用的語言,然後靜待傳譯員接通您的電話。

在家中照顧孩子 Caring for your child at home

活動 Activity

今天讓孩子好好休息或睡覺。

回家後首3至4小時:

- 查看孩子數次。
- 確保可以叫醒孩子。
- 檢查孩子的呼吸情況。
- 檢查孩子的膚色和口唇顏色。

往後的 **24** 小時內,孩子可能行動不穩和思考不清。在此期間:

- 鼓勵孩子做一些安靜的活動,例如閱讀、畫書、砌拼圖、做勞作或看影片。
- 不要在孩子清醒的時候讓其一人獨處。
- **不要**讓孩子做任何要求平衡力或快速思考的 事情,例如跑步、踏單車或做體育運動。
- 不要讓年青人開車或操作機器。

給孩子進食 Feeding your child

不要強迫孩子吃或喝東西,否則可能有窒息危險。

- <u>耐心等候</u>,直至孩子完全清醒後才給孩子食物。
- 若孩子是吃母乳,開始時先作一兩次短時間餵奶,然後才逐漸回復正常的餵哺。
- 若孩子是用奶瓶或杯子喝飲料:
 - 開始時先喝清澈的液體,例如清水、蘋果 汁、薑啤或清湯。
 - 先給一至兩餐,或喝多次清澈的液體。
- 孩子喝得下清澈的液體且沒有嘔吐時,即可以:
 - 給孩子吃少量平時慣常吃的食物,吃一兩次後便可以回復食用下常份量。
- 不要餵得太多或太快,因可導致嘔叶。

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
何時求助 When to get help	
若留意有以下任何情況・前往最就近的急症	若留意有以下任何情況,立即致電 9-1-1:
室:	□ 孩子的呼吸薄弱、緩慢或異常。
□ 孩子在之後兩小時內嘔吐超過3次。	□ 孩子呼吸困難。
□ 孩子在之後超過 24 小時內總是昏昏欲睡或感	□ 孩子口邊皮膚轉藍(若本身膚色較淺),或
到睏倦。	轉白或轉灰(若本身膚色較深)。
□ 孩子不開心、不安或受驚時,您不能把他 /	□ 您不能把孩子叫醒。
她安撫下來。	註: 攜同此頁前往急症室。
□ 在任何時候,任何不良影響的情況變差。	

www.fraserhealth.ca

本資訊不替代醫護人員為您提供的建議。