

Before Procedural Sedation (Child)

برای امنیت شما

یک پرستار رسمی را قبل، در حین و پس از انجام عمل در کنار تخت کودک شما قرار می‌دهیم تا از نزدیک مراقب او و اثرات آرامبخشها بر وی باشد. در صورت بروز هر مشکلی بلافاصله به پزشک اطلاع داده میشود.

پیش از شروع عمل

- تجهیزات اورژانس را به کنار بستر کودک شما می‌آوریم تا در صورت لزوم از آن‌ها استفاده کنیم.
- داروهای خاصی را در کنار بستر کودک شما قرار می‌دهیم. در صورت لزوم، این داروها را برای برطرف کردن اثرات بعضی خواب آورها و مسکن‌ها به کودک شما می‌دهیم. نیاز به اینگونه داروها بسیار بندرت اتفاق می‌افتد.
- برای اندازه‌گیری مقدار اکسیژن در خون کودک شما وسیله‌ای را به یکی از انگشتان او وصل می‌کنیم تا اکسیژن خون او را در همه اوقات تحت نظر داشته باشیم.

در حین عمل

- هر 3 تا 5 دقیقه پرستار موارد زیر را چک میکند:
- چقدر کودک شما خواب آلوده است
 - نبض، فشار خون و میزان تنفس کودک شما (که به آن علائم حیات می‌گویند)
 - میزان اکسیژن کودک شما

بلافاصله پس از عمل

پرستار:

- از نزدیک به نظارت بر علائم حیات و میزان اکسیژن کودک شما ادامه می‌دهد.
- از نزدیک تا زمان بهبودی و بیداری کامل مراقب کودک شماست.

پیش از بیهوشی با استفاده از آرامبخشها (کودکان)

بیهوشی با استفاده از آرامبخشها زمانی است که برای انجام عمل، آزمایش یا درمانی به کودک شما دارویی می‌دهیم تا کودک شما را خواب آلوده، آرام یا راحت سازد (یک خواب آور). همچنین برای عملهای جراحی یا روشهای درمانی همراه با درد به کودک شما دارویی می‌دهیم تا درد را متوقف کنیم.

بیهوشی با استفاده از آرامبخشها از طریق تزریق سیاهرگی (داخل وریدی) یا بوسیله تزریق در ماهیچه (داخل ماهیچه ای) انجام میشود.

بیهوشی با استفاده از آرامبخشها چه خطراتی را در بردارد؟
 همواره استفاده از هر دارویی مخاطراتی در بر دارد. ممکن است کودک شما در حین عمل یا وقتیکه به هوش می‌آید به این دارو عکس العمل نشان دهید.

در حین عمل،

- ممکن است تنفس کودک شما کند شود.
- ممکن است فشار خون کودکان پائین بیفتد.

هنگامیکه پس از عمل کودک شما به هوش می‌آید:

- ممکن است دچار دل بهم خوردگی (تهوع) شود.
- ممکن است بالا بیاورد (استفراغ کند).
- ممکن است خوابهای بد ببیند.

قدمهائی در جهت پیشگیری از بروز اینگونه اتفاقات بر میداریم و همواره در صورت وقوع چنین مواردی آماده ایم.

After Procedural Sedation (Child)

پس از بیهوشی با استفاده از آرامبخشها (کودکان)

مراقبت از کودک در منزل

- در مورد کودکانی که در صندلی کودک در اتوموبیل مینشینند، لازم است از مسافر بزرگسال دیگری بخواهید تا در صندلی عقب همراه کودک بنشینند. در صورتیکه سر کودک شما بطرف جلو بیفتد ممکن است او را دچار مشکل تنفسی کند.
- وقتی به خانه رسیدید بگذارید کودک شما استراحت کرده یا آنکه بخواهد.
- در طول 3 تا 4 ساعت اولیه چندین بار کودک خود را چک کنید.
 - اطمینان حاصل کنید که میتوانید کودک خود را بیدار کنید.
 - چگونگی تنفس کودک را چک کنید.
 - رنگ پوست و لب کودک خود را چک کنید.
- بدلیل آنکه کودک شما ظرف 24 ساعت اولیه دچار عدم تعادل، احساس بهانه گیری و سرگیجه خواهد بود:
 - کودک خود را در زمان بیداری تنها نگذارید.
 - اجازه ندهید کودک شما کارهایی که نیاز به تعادل دارد مانند دویدن، دوچرخه سواری یا بازیهای ورزشی را انجام دهد.
 - به فرزند نوجوان خود اجازه ندهید رانندگی کند یا از وسائل ماشینی استفاده کند.
- داروهای مسکن را طبق دستور پزشک استفاده کنید.
- تا زمانی که کودک بطور کامل بیدار نشده است به او غذا ندهید. با مایعات شفاف مانند آب، آب سیب، جینجر ایل و آب سوپ صاف شده شروع کنید. همینکه کودک شما بتواند مایعات شفاف را بدون آنکه بالا بیاورد بنوشد، تغذیه کودک را با مقدار کمی از غذای معمول او آغاز کنید. به او زیاد و سریع غذا ندهید. اینکار باعث بالا آوردن آنها میشود. اگر کودک شما از پستان شیر میخورد ابتدا با 1 یا 2 بار شیر کم از پستان شروع کرده و سپس به برنامه معمول شیر دادن ادامه دهید.

ما در طول عمل جراحی یا آزمایشی ناراحت کننده به کودک شما برای خوابیدن، سست و آرام شدن، مسکن و آرامبخش دادیم.

ممکن است کودک شما تا 24 ساعت بعد از عمل عوارض آنرا احساس کند.

در کودکان داشتن هر یک از علائم زیر معمول است:

- بالا آوردن
- میل نداشتن به غذا (بی اشتها)
- لرزان بودن یا نداشتن تعادل
- شکایت از سر گیجه
- سستی یا خواب آلودگی
- کج خلقی، بهانه گیری، گریان بودن، زودرنجی

در موارد زیر به نزدیکترین بخش اورژانس مراجعه کنید:

- ظرف یکی دو ساعت آینده کودک شما بیش از 3 بار بالا میآورد.
- پس از گذشت 24 ساعت اولیه کودک شما هنوز به نداشتن تعادل، بهانه گیری یا زودرنج بودن ادامه داده و یا اگر در هر زمانی هر یک از این علائم تشدید شوند.
- داروی مسکن برای کنترل درد کودک شما موثر نیست.

در موارد زیر بلافاصله با 1-1-9 تماس بگیرید:

- تنفس کودک شما کوتاه، کند یا متفاوت با حالت معمول باشد.
- کودک شما مشکل تنفسی دارد.
- رنگ پوست یا لب کودک شما رو به کبودی میرود.
- نمیتوانید کودک خود را بیدار کنید.