

## Comment savoir si le cathéter de drainage fonctionne?

Si vous eu des symptômes de canaux biliaires obstrués, vous remarquerez peu à peu leur diminution. Vous devriez constater l'évacuation d'un liquide jaune foncé dans le sac collecteur. Initialement, le liquide pourrait contenir du sang. Le sang va disparaître peu à peu.

## Combien de temps dois-je garder le cathéter de drainage?

Cela dépend de la raison pour laquelle vous en avez besoin.

Raison...	Le cathéter peut rester...
- blocage	aussi longtemps que le blocage est présent
- perforation dans le canal biliaire	jusqu'à la cicatrisation de la perforation
- avant une intervention chirurgicale	pendant des jours à des mois après l'intervention chirurgicale

Il est préférable de demander au médecin.

## Quand dois-je obtenir de l'aide?

Appelez votre médecin si vous remarquez un des signes suivants :

- fièvre au-dessus de 38,5 °C (101 °F), douleurs musculaires et frissons;
- douleur abdominale persistante;
- douleur ou rougeur au point d'insertion du cathéter ou aux alentours;
- possibilité d'un cathéter bloqué (ce sont les mêmes signes que pour le blocage des canaux biliaires);
- le cathéter tombe.

## Emplacements

**Abbotsford-Regional Hospital** 604-851-4866  
Medical Imaging 2<sup>nd</sup> Floor, Fraser Wing  
32900 Marshall Road, Abbotsford

**Burnaby Hospital** 604-434-4211  
Medical Imaging, 3rd Floor, 3935 Kincaid St., Burnaby

**Lions Gate Hospital** 604-984-5775  
Medical Imaging, Lower Level  
231 East 15<sup>th</sup> Street, North Vancouver

**Royal Columbian Hospital** 604-520-4640  
Medical Imaging, Columbia Tower  
330 E. Columbia Street, New Westminster

**St. Paul's Hospital** 604-806-8006  
Medical Imaging, 2<sup>nd</sup> Floor, Providence Building  
1081 Burrard Street, Vancouver

**Surrey Memorial Hospital** 604-588-3308  
Medical Imaging, 1<sup>st</sup> Floor, Lower Level  
13750 96<sup>th</sup> Avenue, Surrey

**Vancouver General Hospital** 604-875-4111  
GI/GU Department, Jim Pattison Pavilion  
Station 5, Ground Floor  
855 West 12<sup>th</sup> Avenue, Vancouver  
Ext 68612

## HealthLinkBC 8-1-1

Appelez en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes. Le service HealthLinkBC est ouvert 24 heures sur 24.

Il est disponible en 130 langues. Pour avoir accès à un interprète, dites votre langue en anglais. Attendez qu'un interprète prenne votre appel.

[www.fraserhealth.ca](http://www.fraserhealth.ca) – [www.vch.ca](http://www.vch.ca)


Cette information ne remplace pas l'avis de votre prestataire de soins.

October 2015 FH Catalogue # 264803 French  
VCH Catalogue # FK.750.B55.FR



French

# Drainage biliaire Biliary Drainage



Recommandations de suivi/Rendez-vous :

## En quoi consiste le drainage biliaire?

Le drainage biliaire est une intervention qui permet d'évacuer de la bile du foie.

Votre foie fabrique de la bile qui est essentielle pour la digestion. Normalement, les canaux biliaires transportent la bile du foie vers vos intestins, entreposant provisoirement la bile dans la vésicule biliaire.

Cette intervention peut être préconisée pour :

- débloquer un canal biliaire en retirant le blocage ou en y remédiant (la raison la plus courante);
- soulager les symptômes d'une accumulation de bile en permettant au foie de l'évacuer;
- prévenir l'infection et faciliter la cicatrisation quand une perforation dans un canal biliaire provoque des fuites;
- se préparer pour une intervention chirurgicale ou autre intervention sur les canaux biliaires.

Les signes indiquant que les canaux biliaires sont obstrués comprennent : le jaunissement de la peau (jaunisse), une urine foncée, des selles de couleurs très claires, un manque d'appétit et des nausées (avoir mal au cœur).

## Qui effectue cette intervention?

Elle est effectuée par un radiologue d'intervention (un médecin qui se spécialise en interventions guidées par imagerie telles que les radiographies, les radioscopies et les échographies dans un but diagnostique ou thérapeutique).

## Puis-je être accompagné d'un membre de ma famille ou d'un ami?

Oui, ils peuvent rester avec vous avant et après l'intervention. Toutefois, pour des raisons de sécurité et en accord avec les règlements, ils ne peuvent pas être présents dans la salle pendant l'intervention. Nous les aviserons de l'endroit où ils peuvent vous attendre.

**Vous devez demander à un adulte responsable de vous raccompagner à la maison après l'intervention.**

## Que se passe-t-il avant l'intervention?

Le Service d'imagerie médicale vous contactera pour vous donner des instructions spécifiques sur la manière dont vous devez vous préparer pour l'intervention.

## Combien de temps faudra-t-il?

L'intervention durera de 1 à 2 heures.

## Que se passe-t-il pendant l'intervention?

- Une infirmière examine vos antécédents médicaux et vérifie votre pression artérielle et votre fréquence cardiaque.
- Nous vous installons une perfusion intraveineuse dans l'un de vos bras afin de vous donner des analgésiques et autres médicaments dont vous pourriez avoir besoin pendant l'intervention.
- Nous vous branchons sur un moniteur qui vérifiera votre tension artérielle, votre fréquence cardiaque et votre respiration pendant l'intervention.
- À l'aide d'une échographie et d'une radiographie, le radiologue trouve le foie et les canaux biliaires.
- Le radiologue injecte un médicament anesthésiant pour « insensibiliser » la peau autour de la zone affectée.
- Une petite entaille est faite dans la peau. En se servant de l'imagerie comme guide, le radiologue insère une aiguille dans les canaux biliaires, puis guide un cathéter de drainage jusqu'à l'endroit ciblé.
- Pour vérifier l'emplacement du cathéter de drainage, une teinture spéciale pour radiographie est injectée à travers celui-ci et des radiographies sont prises.

- Nous appliquons un bandage sur le site où se trouve le cathéter de drainage et y raccordons le cathéter à un sac collecteur.

## Est-ce que c'est douloureux?

Vous pourriez ressentir des sensations de picotement ou de brûlure au moment de l'injection du médicament anesthésiant. Vous ne devriez éprouver aucune douleur mais par contre, vous pourriez ressentir un peu de pression lors de la mise en place du cathéter de drainage. N'hésitez pas à nous le dire si c'est douloureux pour que l'on vous donne un médicament contre la douleur. Vous pourriez ressentir de la douleur ou une sensibilité après la mise en place du cathéter, mais cet inconfort s'améliorera dans les 7 à 10 jours.

## Que se passe-t-il ensuite?

Nous vous déplacerons dans la zone de rétablissement pendant une période de temps avant que vous soyez transféré dans votre chambre d'hôpital. Votre infirmière vous indiquera le moment où vous pourrez manger et combien de temps il vous faudra rester au lit.

L'infirmière vous montrera comment prendre soin de votre cathéter de drainage et du sac collecteur. Certaines personnes n'auront plus besoin du sac collecteur après quelques jours et le cathéter pourra être rebouché.

La période de convalescence diffère selon la personne. Nous ne pouvons prédire combien de temps vous devrez rester à l'hôpital.

## Existe-t-il des risques ou des complications possibles?

À chaque fois que la peau est percée ou coupée, il existe la possibilité d'infection ou de saignement. Vous êtes étroitement surveillé à l'hôpital pour détecter des problèmes potentiels.

Vous pouvez poser des questions avant de signer le formulaire de consentement.