

Chinese Simplified

耳念珠菌 Candida auris

什么是耳念珠菌?

耳念珠菌(*Candida auris* 或 *C. auris*,发音 candee-da ow-ris)是一种多重耐药的真菌。它在 2009 年被发现,并已迅速蔓延到许多国家。

通常用于治疗其他念珠菌感染的药物对这种类型的念珠菌(多重耐药)往往不起作用。耳念珠菌可引起严重感染,难以治疗。

我如何知道我感染了耳念珠菌?

感染耳念珠菌的症状取决于身体受感染的部位。 耳念珠菌可引起许多不同类型的感染,包括耳朵 感染、伤口感染和血流感染。

最常见的症状是发烧和发冷,用抗生素治疗后没 有好转。有其他医疗问题的人可能根本注意不到 任何症状。

有些人身上某处携带耳念珠菌,但没有受感染, 也没有感染症状。这意味着此人是这种真菌的 "携带者"(称为定植)。这些人会在不知情的 情况下将这种真菌传给其他人。



培养皿中生长的耳念珠菌

谁最有可能感染耳念珠菌?

感染耳念珠菌主要是影响已经有其他医疗问题的 人。健康人通常不会感染耳念珠菌。但如果这些 人是携带者,他们就可能会将耳念珠菌传给其他 不那么健康的人。

如果一个人有以下情况,成为耳念珠菌携带者或感染者的概率就会增大:

- 在加拿大境外接受医疗服务
- 去过耳念珠菌比较常见的国家
- 在加拿大经常接受医疗服务<u>并</u>在那些场合接触到其他旅行者

耳念珠菌是如何传播的?

耳念珠菌可从带菌者或被感染者的身体传给其他 人或附近的物体。这种真菌可以在物体和表面上 存活数周。关键是要防止传播。

如何阻止耳念珠菌的传播

在医院里

如果您是耳念珠菌的携带者,您将被"隔离", 以防止传给医院的其他病人。

隔离的意思是:

- 我们会在您的房间门口贴上一个隔离标志。
- 凡是进入您房间的人,每次进入 时都必须戴上手套并穿上隔离衣。



- 我们要求您使用自己的洗手间或坐便器(轮式马桶椅)。
- **不要**与其他病人或访客**共用**您的洗手间或坐便器。
- 我们要求您的访客在进入您的房间之前和离开 您的房间之后清洁双手。

您可以做什么:

• 经常用酒精搓手液或用肥皂和水清洗 双手,特别是在上完厕所之后、进食或 喝水之前和之后,以及离开您的房间 之前。



- 尽可能呆在您的病房里。
- 您可以到医院的其他区域接受医护所需的治疗和检查。
 - 在医护人员带您去医院的其他区域之前,要遵 循他们的指示,保护好自己和他人。
- 询问医护人员您何时可以走出房间以及可以在何处走动。
- 不要使用公共区域,如病人厨房、礼品店或餐厅。
- 记住在离开您的房间之前始终要清洁双手。

在家里

耳念珠菌可能会传播给健康人,但健康人不像有 病况的人那样容易患病。

如果我们告诉您,您是耳念珠菌感染者或带菌者:

- 要经常洗手,特别是在上完厕所后以及准备食物和讲食前。
- 与您同住的人也应经常洗手。
- 不要共用个人护理用品,如毛巾、浴巾、牙刷或肥皂。
- 使用漂白剂清洁浴室和其他经常接触的表面 (例如电灯开关、水龙头和马桶把手),每天 一次,如果有明显的污垢,则应更经常清洁。
- 非一次性的清洁布每次使用后要清洗。
- 用干净的绷带覆盖开放性渗液伤口。
- 告诉任何协助您进行个人护理(如更换绷带) 的人要戴上一次性手套。

如果您必须返回医院:

告诉护士或医生您携带耳念珠菌。知道您携带这种真菌将有助于医护人员决定您的最佳治疗方法。

手套图片由 Hugo Alberto 创作,取自 Noun Project 隔离衣和手部卫生图片版权由菲沙卫生局(Fraser Health)所有