

응급 치료 서비스 Emergency Services

봉와직염 Cellulitis

귀하 피부의 피하밀층에 염증이 있습니다. 이것은 봉와직염(cellulitis, 'sell-you-light-iss'의 발음)이라고 합니다. 봉와직염은 보통 세균에 의한 감염으로 발생합니다.

봉와직염은 신체의 아무 부위나 발생할 수 있지만 가장 흔한 발생 부위는 얼굴, 다리, 발, 손과 팔입니다. 세균은 벤 상처, 긁힌 상처, 물린 상처 등 피부가 손상된 부위를 통해 침입할 수 있습니다.

일반적으로 치료를 받고 7~10 일 정도 염증이 사라집니다.

언제 진료를 받아야 할까요?

다음과 같은 증상을 보인다면 가정의에게 연락하거나 워크인 클리닉(Walk-in Clinic)에 가서 진찰을 받으십시오.

- 38.5°C (101.3°F) 이상 고열 증상을 보이는 경우,
- 오한이 나거나 땀이 나는 경우,
- 구역이나 구토 증상을 보이는 경우,
- 관절이 뻣뻣한 경우,
- 감염 부위에 붉은 줄이 뻗어나가거나 흉종 부위가 커지는 경우,
- 통증이 심해지는 경우,
- 감염 부위에 물집이 생기는 경우.

집에서 어떻게 요양합니까?

의사의 지시에 따라 정확하게 항상제를 복용하십시오. 비록 다 나은 것 같은 느낌이 들어도 약을 끝까지 다 드십시오.

정맥주사로 혈액에 항생제를 직접 투여할 필요가 있을 경우에는 반드시 하루에 한번 혹은 두번 병원에 오셔서 치료를 받으셔야 합니다.

If we need to give you antibiotics directly into your bloodstream, **you must** return to the hospital once or twice a day for antibiotic treatment.

치료 받으실 병원/Return to: _____

날짜와 시간/Date & time: _____

- 감염 부위가 팔이나 다리에 있는 경우 붓기를 경감하기 위해 팔이나 다리를 베개에 올려놓고 쉬게 하도록 하십시오.
- 감염 부위에 고름이 나오는 경우
 - 응급실 의사나 간호사의 조언에 따라 감염 부위를 드레싱으로 감아 주십시오.
 - 감염 부위를 관리할 때 손을 씻도록 하십시오.
 - 집에서 붓대를 갈 때, 쓰고 난 붓대는 비닐 봉지에 싸서 쓰레기통에 버리십시오.
 - 수영이나 온수욕조 (hot tub)를 사용을 하지 마십시오.
- 하루에 6~8컵의 물을 마시도록 하십시오.

봉와직염 예방법

- 비누, 물로 상처 부위를 깨끗히 씻어 주십시오.
- 피부의 상처 부위(벤 상처, 긁힌 상처나 허빈 상처)를 청결하게 닦고 붕대로 감아 주십시오.
- 당뇨병이 있는 경우 발과 다리에 상처 부위가 있는지 매일 체크하도록 하십시오.

더 많은 정보를 원하시면:

- 가정의에게 문의하시거나,
- 약사에게 문의하시거나,
- HealthLinkBC 문의전화 8-1-1(청각 장애인이거나 난청인인 경우에는 7-1-1)로 전화하시거나 www.HealthLinkBC.ca 웹사이트를 방문하실 수 있습니다.

봉와직염의 증상

다음과 같은 증상을 보이면 봉와직염일 가능성이 있습니다.

- 발적
- 부종
- 통증이나 압통
- 피부가 평상시보다 따뜻하게 느껴집니다.
- 피부 표면이 팽팽하고 매끄러워 보입니다.
- 갑자기 피부 발진이 생기거나 신속히 퍼집니다.

다음과 같은 증상을 보일 수도 있습니다.

- 고열
- 오한
- 구역이나 구토