

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ Emergency Services

ਖਰਖਰੀ Croup

ਖਰਖਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਖਰਖਰੀ ਗਲੇ, ਸੁਰ ਤੰਤੂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਗ (ਇਨਫ਼ਕਸ਼ਨ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਰਖਰੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਜਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਾਹ ਨਲੀ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਡਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹੀ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਐਨੇ ਬੀਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਠੰਡ ਅਤੇ ਫ਼ਲੂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਇਰਸਾਂ ਵਾਂਗ ਖਰਖਰੀ ਪੱਤਝੜ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਖਰਖਰੀ ਦੇ ਸਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਖਰਖਰੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫ਼ਲਦੀ ਹੈ

ਜਿਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਖਰਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜੁਕਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੱਕਣ ਅਤੇ ਖੰਘਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਾਲਗ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ-ਨਾਲੀ ਕੁੱਝ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸਧਾਰਨ ਜੁਕਾਮ ਵਰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ:

- ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੇ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੰਘੂਰਨਾ ਖੰਘ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
- ਖਰਖਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ (2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।

ਮਦਦ ਕਦੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋ

ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜ:

- ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਘਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਬਾਹਰ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੌਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਤੁਰੰਤ 9-1-1 ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜੇ:

- ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ 'ਅੰਦਰ ਨੂੰ' ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਤ ਲਗੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।
- ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੀਲੇ ਜਾਂ ਜਾਮਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨੀਂਦਾ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਰ ਟਪਕ ਰਹੀ ਹੈ।

www.fraserhealth.ca

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਗ ਵਾਇਰਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 2-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੰਘੂਰਨ ਵਾਲੀ ਖੰਘ ਅਤੇ ਰਲ਼ ਵਾਲਾ ਸਾਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:

- ਪਹਿਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਖੰਘੂਰਨ ਅਤੇ ਰਲ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਉ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ (ਵੇਖੋ: 'ਮਦਦ ਕਦੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋ')।
- ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਜੂਸ, ਪਾੱਪਸਿਕਲ ਜਾਂ ਚੂਰਾ ਕੀਤੀ ਬਰਫ਼ ਦਿਉ। ਠੰਡੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਦੁਖਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਰਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਜੇ ਗਲਾ ਦੁਖਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ 38.5 ਸੀ (101.3 ਐਫ਼) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦਿਉ ਜਿਵੇਂ ਐਸੀਟੇਮਾਈਨੋਫਿਨ (ਟਾਇਲਨੋਲ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡ) ਜੇ ਤੁਹਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਰਮਸਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰੋ।

- ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਖੰਘੂਰਨ ਖੰਘ ਅਤੇ ਰਲ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਾਹਰ ਲ ਜਾਉ।
- ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਉ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦਿਉ। ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਖੰਘ ਜਾਂ ਜੁਕਾਮ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਪੁੱਛਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ:

- ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ
- ਹੈਲਥਲਿੰਕ ਬੀਸੀ
 - 8-1-1 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ (ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 7-1-1)। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਰਸ ਜਾਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ।
 - ਆੱਨਲਾਈਨ ਜਾਓ www.HealthLinkBC.ca ਤੇ