家中護理

恢復平時的日常活動及定時透析治療。

插了透析導管時，不可做費力的活動，例如提舉重物。

只可用浴缸洗澡(不可淋浴)。中胸部或乳頭線以下的身體可以沾水。

保持繃帶乾爽和清潔。

在獲告知可除下繃帶之前，不要把繃帶拿掉。

如有需要，可服食純退熱淨(Tylenol)來止痛。

何時求助？

如果透析導管脫出：

- 放平身體躺下。
- 按壓該處。
- 致電 9-1-1。

如有以下的情況，**就要致電醫生：**

- 發燒高過攝氏 38.5 度(華氏 101 度)、疼痛、發冷
- 透析導管部位流血不止
- 透析導管部位或周圍發痛或發紅

如有以下的情況，**就要去最就近的急症室：**

- 突然開始氣促
- 胸痛

地點

Abbotsford-Regional Hospital Medical Imaging 2nd Floor, Fraser Wing 32900 Marshall Road, Abbotsford	604-851-4866
Burnaby Hospital Medical Imaging, 3rd Floor 3935 Kincaid Street, Burnaby	604-434-4211
Lions Gate Hospital Medical Imaging, Lower Level 231 East 15th Street, North Vancouver	604-984-5775
Richmond Hospital Medical Imaging, Main Floor 7000 Westminster Hwy, Richmond	604-278-9711
Royal Columbian Hospital Medical Imaging, Columbia Tower 330 E. Columbia Street, New Westminster	604-520-4640
St. Paul's Hospital Medical Imaging, 2nd Floor, Providence Building 1081 Burrard Street, Vancouver	604-806-8006
Surrey Memorial Hospital Medical Imaging, 1st Floor, Lower Level 13750 96th Avenue, Surrey	604-588-3308
UBC Hospital Medical Imaging, Main Floor 2211 Westbrook Mall, Vancouver	604-822-7076
Vancouver General Hospital GI/GU Department, Jim Pattison Pavilion Station 5, Ground Floor 855 West 12th Avenue, Vancouver	604-875-4111 Ext 68612

卑詩健康結連(HealthLinkBC) **8-1-1**

如有什麼問題或憂慮，可隨時致電。卑詩健康結連是 24 小時可用。

以 130 種語言提供服務。如需要傳譯員，可用英語說出您的語言，然後等到傳譯員來接聽電話。

www.fraserhealth.ca – www.vch.ca

這些資料並不取代醫護人員給您的意見。

August 2022 FH Catalogue # 264674 (Chinese Traditional)
VCH Catalogue # FA.200.T86.CN

fraserhealth | Providence Health Care How you want to be treated. | Provincial Health Services Authority Province-wide solutions. Better health. | Vancouver CoastalHealth Promoting wellness. Ensuring care.

Chinese Traditional

隧道式 血液透析導管 Tunnelled Hemodialysis Catheter



覆診指示/約見：

何謂隧道式血液透析導管？

這是一條特別的靜脈內導管，放置於皮膚底下(隧道式)，通入頸部或上胸部的較大靜脈。這種導管有時稱為 Permcath™。

通常，這是用於需要定時輸血的人士，或者患了慢性腎衰竭並且需要進行血液透析的人士。透析導管有兩個開口，稱為端口(port)。這些端口讓血液透析所需的血液可迅速交換。

有需要的話，透析導管會一直留在原位，有時長達幾個月。

誰負責置入隧道式血液透析導管？

這是由放射科醫生(專長於影像導引手術的醫生)負責。

我可以帶親戚或朋友來嗎？

可以，在手術前後他們可以陪著您。不過，基於安全和規定等理由，手術期間他們不可在房間內。我們會告訴您，家人可以在何處等候。

您必須安排一位‘可靠的成人’在手術後開車送您或陪伴您回家。

手術前情況會怎麼樣？

我們的醫學影像科(Medical Imaging Department)會聯絡您，給您有關如何為手術做準備的具體指示。

需時多久？

手術本身需時大約 45 分鐘至 1 小時，而要恢復過來就需時最多 4 小時。計劃好要在醫院逗留至少 4 至 5 小時。

手術期間情況會怎麼樣？

- 我們會在您其中一條手臂開始靜脈注射，以便我們可施用在手術期間您可能會需要的止痛藥及其他藥物。
- 我們會清潔您的頸部和胸部，然後蓋上消毒蓋布。
- 放射科醫生會注射麻醉藥，使透析導管進入皮膚的那個部位‘失去感覺’。
- 放射科醫生會在皮膚上切開一個小口，然後用超聲波和熒光鏡把透析導管引導入靜脈。
- 透析導管放好之後，通常會以縫兩或三針來使它固定。
- 我們會給透析導管進入皮膚的部位包上繃帶。

痛不痛？

注射麻醉藥時可能會有刺痛或灼痛感。置入透析導管時您可能會感到有點壓力。如覺得痛，要告訴我們，好讓我們能給您施用止痛藥。

會有什麼風險或併發症嗎？

任何時候皮膚被刺穿或切開，都會有感染的可能。另一可能出現的併發症是那個部位出血。

之後情況會怎麼樣？

我們會把您轉移到復甦區，交由一名護士照顧。在此期間，該名護士會檢查您的血壓、心率、呼吸和透析導管部位。

您的縫線須於 7 至 10 天內拆去。誰負責拆線及換繃帶，會因以下各種情況而異：那個人的健康狀況、那個人住在何處以及手術是在哪裏做的。

換繃帶和拆線可能會由以下人士負責：

- ☐ 安排好來您家裏的家居護理(Home Care)護士
- ☐ 您的醫生(在醫務所裏)
- ☐ 您的透析診所護士

轉背頁...