Soins à domicile

Reprenez vos activités quotidiennes ainsi que vos traitements réguliers de dialyse.

Ne faites aucune activité rigoureuse comme soulever des choses lourdes quand le cathéter de dialyse est en place.

Prenez uniquement des bains (pas de douches). Vous pouvez vous mouiller jusqu'au milieu du thorax ou au niveau du mamelon.

Préservez le bandage sec et propre.

Laissez le bandage en place jusqu'à ce qu'on vous dise de le retirer.

Au besoin, prenez un comprimé d'acétaminophène ordinaire (p.ex. du Tylenol) pour atténuer la douleur.

Quand dois-je obtenir de l'aide?

Si votre cathéter de dialyse se retire :

- allongez-vous à plat sur le dos;
- appliquez de la pression sur la zone affectée;
- composez le 9-1-1.

Appelez votre médecin si vous remarquez un des signes suivants :

- fièvre au-dessus de 38,5 °C (101 °F), douleurs musculaires et frissons;
- saignement persistant provenant du point ou est localisé le cathéter de dialyse;
- douleur ou rougeur au point d'insertion du cathéter de dialyse ou aux alentours.

Rendez-vous au service des urgences le plus proche si l'un de ces évènements se produit :

- essoufflement soudain;
- douleurs thoraciques.

Emplacements

Abbotsford-Regional Hospital 604-851-4866
Medical Imaging 2nd Floor, Fraser Wing
32900 Marshall Road, Abbotsford

Burnaby Hospital 604-434-4211
Medical Imaging, 3rd Floor
3935 Kincaid Street, Burnaby

Lions Gate Hospital 604-984-5775
Medical Imaging, Lower Level
231 East 15th Street, North Vancouver

Richmond Hospital 604-278-9711
Medical Imaging, Main Floor
7000 Westminster Hwy, Richmond

Royal Columbian Hospital 604-520-4640
Medical Imaging, Columbia Tower
330 E. Columbia Street, New Westminster

St. Paul's Hospital 604-806-8006
Medical Imaging, 2nd Floor, Providence Building
1081 Burrard Street, Vancouver

Surrey Memorial Hospital 604-588-3308
Medical Imaging, 1st Floor, Lower Level
13750 96th Avenue, Surrey

UBC Hospital 604-822-7076
Medical Imaging, Main Floor
2211 Westbrook Mall, Vancouver

Vancouver General Hospital 604-875-4111 Ext 68612
GI/GU Department, Jim Pattison Pavilion
Station 5, Ground Floor
855 West 12th Avenue, Vancouver

HealthLinkBC **8-1-1**
Appelez en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes. Le service HealthLinkBC est ouvert 24 heures sur 24.

Il est disponible en 130 langues. Pour avoir accès à un interprète, dites votre langue en anglais. Attendez qu'un interprète prenne votre appel.

www.fraserhealth.ca – www.vch.ca

Cette information ne remplace pas l'avis de votre prestataire de soins.

August 2022 FH Catalogue # 264802 (French)
VCH Catalogue # FA.200.T86.FR

fraserhealth | Providence Health Care | Provincial Health Services Authority | Vancouver CoastalHealth

French

Cathéter tunnelisé pour hémodialyse

Tunnelled Hemodialysis Catheter



Recommandations de suivi/Rendez-vous :

Qu'est-ce qu'un cathéter tunnelisé pour hémodialyse?

Il s'agit d'un cathéter intraveineux spécial qui est positionné sous la peau (tunnelisé) et inséré dans une des veines dominantes dans le cou ou le haut du torse. Ce type de cathéter porte parfois le nom de Permcath[MC].

Généralement, il est employé pour les personnes qui ont besoin de transfusions sanguines régulières ou qui souffrent d'une insuffisance rénale chronique et qui requièrent une hémodialyse. Le cathéter de dialyse a deux ouvertures appelées ports. Les ports facilitent l'échange rapide de sang qui est nécessaire pour procéder à une hémodialyse.

Le cathéter de dialyse reste positionné tel quel pendant aussi longtemps que nécessaire (voir même quelques mois dans certains cas).

Qui effectue l'intervention du cathéter tunnelisé pour hémodialyse?

Elle est effectuée par un radiologue (un médecin qui se spécialise en interventions guidées par imagerie).

Puis-je être accompagné d'un membre de ma famille ou d'un ami?

Oui, ils peuvent rester avec vous avant et après l'intervention. Toutefois, pour des raisons de sécurité et en accord avec les règlements, ils ne peuvent pas être présents dans la salle pendant l'intervention. Nous les aviserons de l'endroit où ils peuvent vous attendre.

Vous devez demander à un adulte responsable de vous raccompagner ou de vous conduire à la maison après l'intervention.

Que se passe-t-il avant l'intervention?

Le Service d'imagerie médicale vous contactera pour vous donner des instructions spécifiques sur la manière dont vous devez vous préparer pour cette intervention.

Combien de temps faudra-t-il?

L'intervention durera de 45 minutes à 1 heure et la période de récupération sera d'environ 4 heures ou moins. Prévoyez d'être à l'hôpital pendant au moins 4 à 5 heures.

Que se passe-t-il pendant l'intervention?

- Nous vous installons une perfusion intraveineuse dans l'un de vos bras afin de vous donner des analgésiques et autres médicaments dont vous pourriez avoir besoin pendant l'intervention.
- Nous nettoyons votre cou et votre torse, puis les recouvrons avec des draps stériles.
- Le radiologue injecte un médicament anesthésiant pour « insensibiliser » la peau autour du point où le cathéter de dialyse va transpercer la peau.
- Le radiologue fait une petite entaille dans la peau. Le cathéter de dialyse est guidé dans la veine à l'aide d'une échographie et d'une radioscopie.
- Une fois mis en place, le cathéter de dialyse est ancré de manière sécuritaire, généralement avec deux ou trois points de suture.
- Nous appliquons un bandage sur le point d'insertion où le cathéter de dialyse transperce la peau.

Est-ce que c'est douloureux?

Vous pourriez ressentir des sensations de picotement ou de brûlure au moment de l'injection du médicament anesthésiant. Vous pourriez ressentir un peu de pression lors de la mise en place du cathéter de dialyse. N'hésitez pas à nous le dire si c'est douloureux pour que l'on vous donne un médicament contre la douleur.

Existe-t-il des risques ou des complications possibles?

À chaque fois que la peau est percée ou coupée, il existe la possibilité d'infection. Des saignements provenant du point d'insertion sont également une possibilité.

Que se passe-t-il ensuite?

Nous vous déplacerons dans la zone de rétablissement où vous serez sous observation par une infirmière. À ce moment là, nous vérifierons votre tension artérielle, votre fréquence cardiaque, votre respiration et le point d'insertion du cathéter de dialyse.

Les points de suture devront être retirés dans les 7 à 10 jours suivants l'intervention. La personne responsable pour le retrait des points de suture et les changements de bandage varie selon la santé du patient, où il vit et où l'intervention a eu lieu.

Les changements de bandage et le retrait des points de suture peuvent être effectués par :

- ☐ une infirmière de soins à domicile qui vient vous voir à la maison;
- ☐ votre médecin dans son cabinet;
- ☐ votre infirmière de la clinique de dialyse.

suite…