

کوئلن کے سر دے ٹیسٹ بارے تੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਊਂਦੀ ਹੈ।

50-74 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ:

- ਟੈਸਟ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਰੋਕਬਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪੌਲੀਅਪਸ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਅਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੀਅਪਸ ਛੋਟੇ ਵਾਧੇ (ਗਰੋਬਜ਼) ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਨ (ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ) ਜਾਂ ਗੁਦਾ (ਰੈਕਟਮ) ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
- ਟੈਸਟ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ।

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਦੋ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹਨ - ਫਿਕਲ ਇਮਿਊਨੋਕੈਮੀਕਲ ਟੈਸਟ (ਐੱਫ਼ ਆਈ ਟੀ) ਅਤੇ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ।

ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟੱਟੀ ਵਿਚ ਖੂਨ, ਪੇਟ ਵਿਚ ਦਰਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਟੀ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਾਂ ਚਾਣਚੱਕ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਬੀ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਕੋਲਨ ਸਕਰੀਨਿੰਗ

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਕੋਲਨ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਲ ਇਮਿਊਨੋਕੈਮੀਕਲ ਟੈਸਟ (ਐੱਫ਼ ਆਈ ਟੀ) ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲੈਬ ਲਈ ਫਾਰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ (ਭੇਜਦਾ) ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਟੀ ਨਤੀਜੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਬੀ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਕੋਲਨ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਿੰਠੀ ਵੀ ਭੇਜੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?

- ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ।
- ਜੇ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਮੌਕਾ 90 ਫੀ ਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
- ਬੀ ਸੀ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 3000 ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 - 94% 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ।
 - 56% ਮਰਦ ਹਨ।
 - 44% ਅਰਦੋਂ ਮਈਨ

ਫਿਕਲ ਇਮਿਊਨੋਕੈਮੀਕਲ ਟੈਸਟ (ਐੱਫ਼ ਆਈ ਟੀ) ਕੀ ਹੈ?

ਐੱਫ਼ ਆਈ ਟੀ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੱਟੀ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੌਲੀਅਪਸ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਪੜਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ:

1. ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਟੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ (ਡਾਕਟਰ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਟੀ ਕਿੱਟ ਲਈ ਇਕ ਆਰਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇਵੇਗਾ।
2. ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਫਾਰਮ ਕਿਸੇ ਲੈਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਚੁੱਕੋ। ਲੈਬਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲਈ www.screeningbc.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।
3. ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਵਿਚ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਮ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
4. ਆਪਣਾ ਸੈਂਪਲ (ਨਮੂਨਾ) ਲੈਬ ਵਿਚ ਛੱਡੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਪਲ, ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਲੈਬ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
5. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੋਰਮਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕੋਅਰਕੰਪਸ ਰਾਹੀਂ, ਬਚ.ਮੇਚਾਰਏਚੋਮਪਾਸ.ਲਾਈਲਾਬਸ.ਚੋਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕੋਅਰਕੰਪਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਬ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਟੀ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

6. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਾਧਾਰਣ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਟੈਂਸਟਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਸਾਧਾਰਣ ਐਂਡ ਆਈ ਟੀ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਕੀ ਹੈ?

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਇਕ ਟੈਂਸਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਨ (ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ) ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤਹਿ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕ ਲਚਕਦਾਰ ਟਿਊਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਇਕ ਨਿੱਕਾ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਂਸਟ ਦੌਰਾਨ, ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੌਲੀਅਪਸ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡੋਨੋਮਾ (ਜ਼) ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਐਂਡ ਆਈ ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਟੈਂਸਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਕਿਸ ਦਾ ਟੈਂਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਟੈਂਸਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 50 ਅਤੇ 74 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਸਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ:

ਐਸਤ ਖਤਰਾ	ਫੀਕਲ ਇਸਿਊਨੋਕੈਸੀਕਲ ਟੈਂਸਟ (ਐਂਡ ਆਈ ਟੀ)
ਐਂਡ ਆਈ ਟੀ ਦਾ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਸਟ ਕਰਵਾਉ (ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ)	
ਐਸਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ	ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡੋਨੋਮਾਜ਼ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 74 ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਹਰ ਤਿਨ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।	
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।	
<ul style="list-style-type: none"> ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ (ਮਾਪਾ, ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ, ਬੱਚਾ) ਵਿਚ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਸੀ; ਜਾਂ, ਦੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਸੀ। 	
ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦਾ ਟੈਂਸਟ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।	

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ, ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਸ ਜਾਂ ਕਰੋਹਨਜ਼ ਡਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ (ਡਾਕਟਰ) ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਟੈਂਸਟਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।

ਕੋਲਨ ਦੇ ਟੈਂਸਟ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

- ਕੋਲਨ ਦਾ ਟੈਂਸਟ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਣ ਟੈਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਂਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਟੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸਾਧਾਰਣ (ਅਬਨੋਰਮਲ) ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਟੀ ਨੌਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਲਨ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਪੌਲੀਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੌਲੀਅਪਸ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਟੈਂਸਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਟੈਂਸਟ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਟੈਂਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਂਸਟ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਟੈਂਸਟਾਂ ਲਈ ਵਾਧਸ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਕਈ ਕੈਂਸਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਉਮਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਪਰ, ਖੋਜ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਂਦਰ ਵਿਚ ਸੁਰਾਖ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

BC Cancer Colon Screening

801-686 West Broadway Vancouver, BC V5Z 1G1

ਫੋਨ: 1-877-702-6566

ਈਮੇਲ: screening@bccancer.bc.ca

ਵੈੱਬ: www.screeningbc.ca/colon

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਰਸਨਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਤਿਵਾਧਿਕਾਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਗਹ ਦੇਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚੰਭਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਅਗਹ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੁਗਾਲਟੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਥੀ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਓਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕੈਂਸਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਐਡਰੈਸ: 801 – 686 West Broadway, Vancouver BC V5X 1G1, ਵੈੱਬ: www.screeningbc.ca/colon ਜਾਂ ਈਮੇਲ: screening@bccancer.bc.ca)