

为什么要接种疫苗？

疫苗可以拯救生命并保护人们免受危险的致命感染的侵袭。包括您在内的器官移植受者的感染风险会增高，因为您需要服用抗排斥药物。这类药物会削弱您的免疫系统。

理想状态下，您应在**移植**之前接种所有必要疫苗。但是，若您没有足够时间在移植前接种全部推荐疫苗，也可在移植后 3 至 6 个月内接种。

在您接受移植后，灭活疫苗是安全的，而**活疫苗是不安全的。请咨询移植团队。**

您的移植团队推荐接种以下疫苗：

- 嗜血杆菌流感疫苗 (Hib)
- 乙肝疫苗
- 人类乳突病毒疫苗 (Gardasil®)
- 灭活脊髓灰质炎疫苗 (IPV)
- 流感 (Flu) 疫苗
- 脑膜炎球菌疫苗 (四价)
- 肺炎链球菌疫苗 (Pneumovax-23®)
- 肺炎链球菌疫苗 (Pneumovax-23®)
- 带状疱疹疫苗 (Shingrix®)
- 破伤风、白喉 (TD) 或破伤风、白喉、百日咳 (TDAP) 疫苗

带状疱疹疫苗 (Shingrix®)

此疫苗可保护您免于带状疱疹的威胁，这种疾病是由于水痘-带状疱疹病毒引起的。带状疱疹会导致皮疹，并伴有疼痛和水疱，可持续 2 到 4 周。

大约每 3 人中就有 1 人会在一生中感染带状疱疹。50 岁以上和免疫系统薄弱的人群更易感染。我们强烈建议年满 50 岁的移植受者接种 Shingrix® 疫苗。

您将需要接种两剂疫苗，间隔 2 至 6 个月。

费用：此疫苗需付费。

乙肝疫苗

这种疫苗可以保护您免于乙肝及其并发症（例如永久性肝脏损伤）的威胁。乙肝可通过血液或体液传播。

在三个月中接种三剂。在您接种最后一剂疫苗后 1 至 2 月间，您将接受血液检测，以检查您是否对疫苗产生反应。

费用：此疫苗**免费提供。**

人类乳突病毒 (HPV9) 疫苗 (Gardasil®)

此疫苗可保护您免于宫颈癌、肛门癌和生殖器疣的威胁，它们是由 HPV 引起的最常见性传播感染疾病。

在三个月中接种三剂。我们建议面临相关风险的个人接种。若您被建议接种这一疫苗，请与团队讨论。

费用：此疫苗需付费。

流感疫苗

流感（流感病毒感染）可导致严重威胁生命的疾病，并提高其它感染的风险。这对于老年人和免疫系统削弱的人群尤其如此。

流感可通过咳嗽、喷嚏或面对面接触传播。您应**每年**接种流感疫苗，以保护自己免受季节性流感威胁。

费用：灭活流感疫苗**免费提供。**

肺炎链球菌疫苗 (Pneumovax-23® 及 Pprevnar 13®)

此疫苗保护您免于多种肺炎链球菌的威胁，它们能导致严重威胁生命的疾病，例如：

- **脑膜炎：**脑膜感染
- **肺炎：**肺部感染
- **败血症：**血液感染

肺炎链球菌感染可通过咳嗽、喷嚏、近距离面对面接触或唾液/痰传播。

您的移植团队建议您考虑同时接种 Pneumovax-23® 疫苗和 Pprevnar 13® 疫苗。

费用： Pneumovax-23® 疫苗**免费**提供，但 Pprevnar 13® 疫苗需付费。

去哪里接种疫苗？

- 公共卫生部门
- 家庭医生诊所
- 当地药房

脑膜炎球菌疫苗 (四价)

此疫苗保护您免于4种最常见脑膜炎球菌 (A、C、Y和W型) 的威胁。

脑膜炎球菌感染可通过咳嗽、喷嚏或面对面接触传播。也可通过唾液传播。

虽较为罕见，但其可造成严重威胁生命的感染，包括血液和脑部感染。感染的并发症可能非常严重，并可能造成包括永久性大脑损伤、失聪、肢体缺损在内的损伤。

费用： 此疫苗**免费提供**。每 5 年接种一剂加强针。


避免接种活疫苗

若家庭成员接种了活疫苗，请咨询移植团队

- 结核病 BCG 疫苗 (Oncotice®)
- 鼻腔流感疫苗 (FluMist®)
- 麻疹、流行性腮腺炎、风疹 (MMR, Priorix®) 口服伤寒疫苗 (Vivotif®)
- 水痘、水痘-带状疱疹疫苗 (Varivax®、Zostavax®)
- 黄热病疫苗 (YF-VAX®)

为实体器官移植受者 接种疫苗

您是否如期接種了各種疫苗？



Vancouver
Coastal Health



northern health
the northern way of caring

island health



Interior Health

